

Естественный отбор, митотический цикл и разнообразие биогеоценозов

От клетки до экосистемы: одна логика изменений и отбора.



От клетки до сообщества: единая логика изменений

- Клеточное деление создаёт наследуемые различия, отбор усиливает удачные варианты, а связи между видами удерживают разнообразие сообщества.



Клеточный цикл: четыре основные стадии

1. Рост и подготовка

В G₁ клетка растёт, накапливает вещества и готовится к следующему этапу. Именно здесь оцениваются условия, при которых деление вообще будет безопасным и полезным.

2. Копирование ДНК


В S-фазе происходит удвоение молекулы ДНК. Благодаря этому каждая будущая дочерняя клетка получает полный набор наследственной информации, необходимый для нормальной работы.

3. Проверка и деление

В G₂ клетка проверяет завершённость репликации и готовность к делению. Затем в фазе М хромосомы распределяются между двумя дочерними клетками.

4. Итог цикла

Клеточный цикл помогает точно передавать наследственный материал. Контрольные точки снижают число ошибок, но не устраняют их полностью.



Контрольные точки и точность деления

1. G1-контроль


G1-контроль оценивает размер клетки, наличие питательных веществ и общую готовность к дальнейшему циклу. Если условия недостаточны, деление замедляется или останавливается.

2. G2-контроль

G2-контроль проверяет, завершилось ли удвоение ДНК и нет ли серьёзных повреждений. Это предотвращает передачу дефектов в дочерние клетки.

3. Контроль веретена

Контроль веретена деления отслеживает прикрепление хромосом. При сбое возрастает риск неравного распределения наследственного материала и нарушений в потомстве клетки.



Репликация ДНК как источник наследуемых различий

1. Точное копирование

Во время S-фазы каждая молекула ДНК служит матрицей для синтеза новой. В результате дочерние клетки получают почти одинаковые наборы генетической информации.

2. Редкие ошибки

Иногда в процессе копирования возникают редкие ошибки. Часть из них исправляется системами репарации, но некоторые остаются и становятся наследуемыми изменениями.

3. Материал для отбора

Если изменение не мешает клетке, оно может сохраняться в линии последующих делений. Так появляются новые варианты признаков, на которые затем действует отбор.

Как возникают мутации в соматических клетках

Ошибки копирования

Ошибки репликации могут привести к замене нуклеотидов, вставкам или выпадениям участков ДНК. Такие изменения иногда меняют работу гена и признаки клетки.

Повреждение молекулы


Повреждения ДНК возникают под действием химических веществ, излучения или внутренних процессов клетки. Если их не исправить, при делении они закрепляются как мутации.

Сбой распределения

Нарушение распределения хромосом во время митоза может дать дочерним клеткам разный набор наследственного материала. Это часто нарушает их жизнеспособность и функции.

Митоз и мейоз: почему это не одно и то же

Схема показывает, что митоз поддерживает постоянство, а мейоз создаёт новые комбинации наследственного материала.



Естественный отбор: главные условия

			
Наследственность Наследуемый признак может передаваться потомкам только тогда, когда он закодирован в ДНК. Без наследственности и удачный вариант не закрепляется в популяции.	Изменчивость В популяции должны существовать отличия между особями. Именно разнообразие признаков создаёт материал, с которым может работать естественный отбор.	Различия в выживании Одни особи чаще доживают до размножения, чем другие. Разница в выживании становится заметной только тогда, когда условия среды отбирают наиболее приспособленных.	Размножение Если носитель полезного признака оставляет больше потомков, этот признак постепенно встречается чаще. Так меняется состав популяции от поколения к поколению.

Примеры отбора в реальной жизни



Бактерии и антибиотики

В популяции бактерий после курса антибиотика выживают не все клетки. Сохраняются те, у которых уже была устойчивость, а затем они быстрее размножаются и занимают освободившееся пространство. Среда не создаёт устойчивость заново — она отбирает тех, кто её уже имел.



Растения на сухом склоне

На сухом открытом склоне преимущество получают растения, которые экономно расходуют воду: имеют более узкие листья, плотную кожицу или другие защитные признаки. Влажные и тенивые условия были бы выгодны уже другим вариантам. Отбор зависит от среды, а не от «стремления» вида.

Стрелка причинности: от клетки к биогеоценозу

Причинная цепочка показывает, как наследуемые изменения на клеточном уровне отражаются в популяциях и биогеоценозах.



В популяции отбор действует на особей,
а не на вид в целом: именно различия в успехе
размножения меняют частоты признаков.

Школьный курс общей биологии; популяционная генетика.

ПОПУЛЯ ЦИЯ

— ЭТО
ОСНОВНАЯ
ЕДИНИЦА
ЭВОЛЮЦИИ.

Балансирующий отбор может сохранять несколько вариантов признака одновременно, если они по-разному выгодны в разных условиях среды.

Популяционная генетика; примеры поддержания полиморфизма в природных популяциях.

2

и более вариантов признака могут удерживаться в популяции длительное время.

Как виды делят пространство и ресурсы

Свет и тень

На яркой поляне один вид быстрее накапливает биомассу при хорошем освещении, а другой уступает ему в открытом месте. Но в тени их роли меняются: там преимущество получает более теневыносливая форма.



Разные размеры ресурса

В одном сообществе птицы могут делить корм по размеру семян. Крупные семена достаются виду с мощным клювом, мелкие — более мелкому специалисту, который иначе бы проиграл прямую конкуренцию.



Одна среда — много ниш

Даже близкие виды могут жить рядом, если используют разные микроместа: кроны, подлесок, опад или почву. Такое разделение снижает давление конкуренции и делает сообщество более богатым по составу.



Когда редкость становится преимуществом

1. Преимущество редкости

Если хищник чаще распознаёт обычную окраску, редкий вариант дольше остаётся незамеченным. В результате редкая форма получает больше шансов дожить до размножения.

2. Давление врагов

При паразитах и болезнях наиболее массовый генотип часто встречается с ними чаще всего. Тогда именно редкие варианты признаков помогают части особей избегать заражения и сохраняться в популяции.

3. Смена выгод

Когда признак становится слишком обычным, конкуренция внутри группы усиливается. Редкие особи могут воспользоваться менее занятым ресурсом и временно обойти более распространённые формы.



Механизм и следствие: краткая сводка

Сводка показывает, как разные процессы меняют наследственное разнообразие и взаимодействие видов.

Одни механизмы создают разнообразие, другие его сохраняют; вместе они поддерживают устойчивость популяций и сообществ.

Механизм	Результат	Эффект
Мутация	Новый аллель	Изменчивость
Балансирующий отбор	Полиморфизм	Сохранение вариантов
Миграция	Приток аллелей	Выравнивание популяций
Нишевая специализация	Сосуществование видов	Снижение конкуренции

Популяционная генетика; экология сообществ.

Как миграция поддерживает наследственное разнообразие

Приток генов

Мигранты приносят в популяцию новые аллели и уменьшают генетическую изоляцию. Это особенно важно для малочисленных групп, где случайная потеря вариантов происходит быстрее.

Снижение изоляции

Обмен особями между соседними популяциями помогает компенсировать последствия инбридинга и поддерживает жизнеспособность потомства. Генетическое разнообразие при этом возрастает без полного смешения групп.

Запас для адаптации


Если среда меняется, популяция с более широким набором аллелей имеет больше шансов сохранить часть особей, уже подходящих к новым условиям. Так миграция повышает адаптивный потенциал.



Когда условия меняются во времени

На схеме показано, что преимущества генотипов меняются вместе с погодными условиями, поэтому ни один вариант не исчезает полностью.

Преимущество зависит от среды: при смене условий полезные варианты чередуются, а разнообразие сохраняется как запас устойчивости.



Условная иллюстрация принципа частотно-зависимого и сезонного отбора, основанная на школьной модели.

Почему разнообразное сообщество устойчивее

1. Много видов — больше запас

Чем больше видов в сообществе, тем больше вероятность, что хотя бы часть организмов сохранит работу экосистемы при изменении климата, засухе или вспышке численности хищников.

2. Функциональное замещение

Если один вид исчезает, его функцию могут частично взять на себя другие организмы. Такое функциональное замещение смягчает последствия потери и предотвращает резкий обвал связей.

3. Сеть связей

Разнообразие цепей питания и способов использования ресурсов делает систему менее уязвимой к случайным нарушениям. Поэтому богатые по составу биогеоценозы обычно устойчивее однообразных.



Главная проверка проста: у эволюции нет цели заранее, а успех признака измеряется числом потомков, а не «полезностью» для вида в целом.

Дарвин Ч.; школьный курс эволюционного учения.

1

**причина отбора —
не польза для вида,
а различия
в размножении
особей.**

От наследственности к устойчивости

От клетки до экосистемы действует одна логика:
наследуемые различия проходят через отбор, закрепляются
в популяциях и в итоге помогают сообществам сохранять
устойчивость.

