

Представления о возникновении жизни и эволюции органического мира

Как из неживой материи возникла жизнь и почему она стала такой разнообразной?



Почему происхождение жизни до сих пор изучают ученые

Земле около 4,54 миллиарда лет, а надежные следы жизни намного моложе. Чтобы понять переход от неживого к живому, исследователи сопоставляют данные геологии, палеонтологии, биохимии, молекулярной биологии и генетики.



Основные представления о происхождении жизни

Креационизм

Эта точка зрения связывает возникновение жизни с актом творения и не строится на проверяемом механизме. Поэтому в науке она не рассматривается как объяснение, подтверждаемое экспериментом и наблюдением.

Самозарождение и его опровержение

Раньше считали, что живое может постоянно возникать из неживого. Опыты Луи Пастера показали, что в современных условиях такое самозарождение не наблюдается, а жизнь связана с уже существующей жизнью.

Панспермия

Согласно этой гипотезе, зачатки жизни могли быть занесены на Землю из космоса. Она объясняет возможный источник органического материала, но не отвечает на главный вопрос о первом возникновении жизни.


Абиогенез

Современная биология считает наиболее обоснованным путь химической эволюции: из простых веществ постепенно возникли органические молекулы, затем предбиологические системы и, наконец, первые клетки.



Этапы химической эволюции на ранней Земле

Схема отражает последовательность превращений, которые могли привести к появлению первых клеток



Опыт Миллера—Юри как доказательство возможности абиогенного синтеза

1. Модель условий

В 1953 году Миллер и Юри собрали установку, в которой воспроизвели предполагаемую атмосферу ранней Земли. Они использовали воду, газовую смесь и электрические разряды как источник энергии.

2. Результат опыта

После работы системы в ней обнаружили аминокислоты — важнейшие строительные блоки белков. Это стало убедительным доказательством того, что органические вещества способны возникать без участия организмов.

3. Значение для науки

Эксперимент не создал жизнь, но показал принципиальную возможность химического пути от простых веществ к более сложным соединениям. Именно так лаборатория помогает проверять гипотезы о прошлом Земли.



Гипотеза РНК-мира

1. Двойная роль РНК

РНК может не только хранить наследственную информацию, но и участвовать в химических реакциях. Такое сочетание функций делает ее удобным кандидатом для самых ранних этапов эволюции.

2. Рибозимы

Открытие рибозимов показало, что некоторые молекулы РНК способны работать как катализаторы. Значит, жизнь могла начаться с систем, где одна молекула одновременно сохраняла сведения и ускоряла реакции.

3. Переход к наследственности

Гипотеза объясняет, как химические системы постепенно приобрели устойчивую передачу информации. В ранней эволюции преимущество получали более точные и стабильные молекулярные структуры, способные лучше копироваться.



Первые организмы: прокариоты и анаэробная жизнь

Простая клеточная организация


Первые организмы были одноклеточными прокариотами без оформленного ядра и мембранных органоидов. Такая организация была проще, но уже обеспечивала разделение функций и защиту наследственного материала.

Жизнь без кислорода

Ранняя атмосфера почти не содержала свободного кислорода, поэтому обмен веществ у древних форм был анаэробным. Это позволяло им существовать в условиях, которые были бы неблагоприятны для большинства современных организмов.

Преимущество клетки


Клеточная оболочка помогла отделить внутреннюю среду от внешней, а специализированные молекулы — эффективнее использовать ресурсы. Именно клеточная организация сделала жизнь более устойчивой и разнообразной.



Хронология ключевых этапов ранней эволюции жизни

Между важнейшими событиями проходили сотни миллионов и даже миллиарды лет, поэтому ранняя история жизни была очень медленной и неравномерной.

Чем древнее этап, тем больше временной разрыв до следующего рубежа: жизнь развивалась постепенно, через долгие периоды накопления изменений.



Обобщенные данные геологии и палеобиологии: возраст Земли — около 4,54 млрд лет; древнейшие следы жизни — 3,8–3,5 млрд лет; кислородное событие — около 2,4 млрд лет; первые эукариоты — 2,1–1,8 млрд лет; кембрийский рубеж — 0,6–0,54 млрд лет.

Фотосинтез и кислородная революция

1. Первые производители кислорода


Цианобактерии стали организмами, которые начали активно выделять кислород в процессе фотосинтеза. Их деятельность постепенно изменила состав атмосферы и океанов, хотя этот процесс был очень длительным.

2. Смена условий жизни

Для многих анаэробных организмов кислород оказался токсичным, поэтому часть древних форм исчезла. Одновременно появились возможности для аэробного дыхания, которое дает клеткам значительно больше энергии.

3. Новая защита планеты

Накопление кислорода способствовало образованию озонового слоя. Он ослабил действие ультрафиолетового излучения и сделал условия на поверхности Земли более благоприятными для дальнейшего развития жизни.



Как симбиоз изменил строение клеток




Митохондрии: потомки древних бактерий

Митохондрии напоминают самостоятельных организмов: у них есть собственная ДНК, двойная мембрана и способность делиться независимо от ядра. Эти признаки поддерживают идею, что когда-то они были свободноживущими бактериями, вошедшими в состав более крупной клетки.



Хлоропласты и союз для фотосинтеза

Хлоропласты тоже сохраняют черты бактериального происхождения и связаны с фотосинтезом. Их появление стало важным шагом в усложнении клетки, потому что симбиоз дал новому организму дополнительные источники энергии и новые способы существования.



Сравнение основных этапов эволюции живого мира



Этап	Признаки	Значение
Прокариоты	анаэробный обмен	первые клетки
Эукариоты	ядро, органоиды	рост сложности
Многоклеточность	специализация клеток	новые функции
Человек	мозг, культура	осознанная деятельность

Обобщение данных биологии, палеонтологии и эволюционной теории

Основные этапы эволюции последовательно повышали сложность организации и расширяли среду обитания организмов.

Каждый последующий этап не заменял предыдущий полностью, а создавал новые уровни организации и больше экологических возможностей для жизни.



Движущие силы эволюции

1.

Наследственная изменчивость

Мутации и рекомбинации постоянно создают различия между особями одной популяции. Именно это разнообразие служит исходным материалом для эволюционных изменений и делает развитие живых систем непредсказуемым.

2.

Естественный отбор

В конкретных условиях среды сохраняются признаки, повышающие выживание и успешное размножение. Отбор действует не на абстрактную «полезность», а на реальные различия в приспособленности организмов.

3.

Дополнительные факторы

Борьба за существование, дрейф генов и изоляция тоже меняют популяции, особенно небольшие и разобщённые. Эти процессы могут усиливать различия и ускорять возникновение новых форм.

4.

Нет заранее заданной цели

Эволюция не движется к заранее известному результату. Она идёт через накопление наследственных изменений, а направление процесса задают среда, случайность и отбор наиболее приспособленных вариантов.




Схема естественного отбора в популяции

Схема показывает не единичный акт, а повторяющийся цикл, в котором среда «отбирает» фенотипические различия, а их последствия закрепляются в поколениях.

Отбор работает ступенчато: сначала возникают различия, затем они проверяются средой, после чего частоты признаков в популяции меняются.



Обобщённая схема по эволюционной биологии



Доказательства эволюции органического мира

Ископаемые остатки

Последовательность слоёв земной коры хранит сведения о смене древних организмов во времени. Находки переходных форм помогают проследить, как появлялись новые признаки и крупные группы.

Гомологичные органы

Сходное строение конечностей, клювов или плавников у разных видов указывает на общее происхождение. При этом функции могут отличаться, что отражает расхождение эволюционных путей.

Рудименты и атавизмы


Редуцированные органы и редкие возвратные признаки показывают, что современные организмы унаследовали черты от предков. Такие структуры особенно ценны для восстановления истории изменений.

Сходство эмбрионов

На ранних стадиях развития у родственных групп заметны общие черты строения. Это говорит о единстве происхождения и о том, что основные планы развития возникли давно.

Молекулярные данные

Сходство ДНК, РНК, белков и универсальность генетического кода подтверждают родство всех живых организмов. Чем ближе виды, тем меньше различий в их молекулярных последовательностях.



Кембрийский взрыв и резкое расширение разнообразия животных

Быстрый рост разнообразия


Около 541 млн лет назад по геологическим меркам резко увеличилось число животных форм. Это событие не означало мгновенного появления жизни, а отражало ускорение эволюции многоклеточных.

Новые структуры тела

В кембрии широко распространились твёрдые скелеты, сложные органы чувств и разные планы строения тела. Они помогли организмам лучше защищаться, двигаться и взаимодействовать с окружающей средой.


Изменение экосистем

Активное хищничество усилило конкуренцию и усложнило пищевые цепи. Морское дно стало более разнообразным по составу сообществ, а многие группы животных быстро заняли новые экологические ниши.



Переход жизни из воды на сушу

Обобщённая последовательность крупных этапов освоения наземной среды в эволюции организмов



Массовые вымирания как фактор эволюции

Резкое сокращение видов


Массовые вымирания уничтожали значительную часть живых организмов за сравнительно короткое время. При этом они не прекращали эволюцию, а меняли её направление и темпы.

Освобождение ниш

После биологического кризиса в экосистемах появлялись свободные ресурсы и пространства. Это создавало условия для быстрого расселения уцелевших групп и возникновения новых форм.

Новые лидеры биосферы


После вымирания динозавров особенно заметно возросла роль млекопитающих и птиц. Они заняли освободившиеся экологические позиции и начали быстро увеличивать разнообразие.



Пять массовых вымираний фанерозоя

Даже самые тяжёлые кризисы не уничтожали жизнь полностью: после каждого вымирания происходило восстановление биосферы и перераспределение доминирующих групп.

Пермское вымирание выделяется как самый масштабный кризис, а остальные события показывают, что эволюция шла через чередование потерь и восстановления.



Обобщение общепринятых оценок масштабов массовых вымираний в палеобиологии



Антропогенез и место человека в системе живого мира

1. Положение в классификации

Человек относится к царству Животные, типу Хордовые, классу Млекопитающие, отряду Приматы и семейству Гоминиды. Такое положение отражает его эволюционное родство с другими приматами.

2. Биологические признаки


Ключевыми чертами антропогенеза стали прямохождение, увеличение объёма мозга, развитие кисти и усложнение поведения. Эти изменения повышали способность к труду, ориентации и взаимодействию в группе.

3. Орудия и речь

Изготовление орудий и развитие членораздельной речи сделали человека особым видом. Благодаря им знания перестали ограничиваться наследованием генов и начали передаваться через обучение.

4. Культурная эволюция

История человека включает не только биологические изменения, но и накопление культуры. Нормы, технологии и опыт передаются между поколениями, ускоряя развитие общества гораздо сильнее, чем генетические изменения.



Жизнь на Земле: история длительной эволюции



Живой мир не возник мгновенно: его разнообразие сформировалось через химическую эволюцию, появление клеток и миллиарды лет изменений. Эти выводы подтверждаются разными науками и продолжают сегодня.