



Введение: значение МХОВ В БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Мхи — основа болот, регулирующая воду, формирующая торф и поддерживающая жизнь.



Что такое болота и почему они важны?

Болота — это влажные экосистемы с избытком влаги и низким кислородом в почве. Они создают уникальную среду, где главную роль играют мхи, особенно сфагновые.



Основные виды мхов в болотах



Сфагновые мхи — главные строители торфа

Сфагнум образует плотные моховые ковры светло-зеленого цвета, которые аккумулируют воду и создают основу для торфа. Эти мхи мягкие и хорошо удерживают влагу.



Кукушкин лен — пушистый защитник болота

Кукушкин лен — мох с прямостоячими жесткими побегами, который встречается на влажных участках. Он помогает удерживать почву и создает дополнительную структуру болот.



Бриевые мхи — обитатели влажной среды

Бриевые мхи растут у воды и на влажных почвах болота. Они образуют мелкие плотные куртинки, способствуя разнообразию растений и обеспечению среды для мелких животных.


20–30

раз — такой объем воды способен удерживать сфагнум по сравнению с собственной массой.

Исследования Института ботаники РАН

Сфагнум содержит две группы клеток: фотосинтезирующие живые и гиалиновые для хранения влаги, что делает его невероятно влагозадерживающим.

Роль мхов в регулировании влажности болота



- Мхи впитывают и накапливают большие объемы воды, предотвращая её быстрое стекание и защищая почву от иссушения.

- Плотный моховой покров стабилизирует уровень воды, поддерживая жизнь водолюбивых растений и животных даже в засуху.

Вклад мхов в образование торфа

.1

Отмершие части мхов при недостатке кислорода разлагаются очень медленно, способствуя накоплению органики.

.2

Этот процесс приводит к формированию толстого слоя торфа, достигающего более 5 метров в верховых болотах.

.3


Мхи обеспечивают до 80% всей массы торфа, оказывая решающее влияние на структуру и химический состав болота.

Доля мхов в формировании торфа

Исследования подтверждают, что сфагновые мхи доминируют в верховых болотах по массе образованного торфа.

Высокая пористость и большая влагопоглощающая способность торфа связаны с преобладанием мховых остатков.

РАН, 2022



Влияние мхов на кислородный режим и разложение органики

.1

Толстый слой мха изолирует поверхность и снижает доступ кислорода к почве, замедляя микробные процессы.

.2

Медленное разложение растительных остатков ведет к накоплению органического вещества и образованию торфа.

.3

Низкий уровень кислорода ограничивает рост аэробных бактерий, что сохраняет биологическое разнообразие.

.4

Такие условия поддерживают устойчивость болотных экосистем и способствуют сохранению экосистемных функций.

Типы болот и доминирующие виды мхов

Сравнение типов болот по мховому составу и географическому расположению.

Разные виды мхов формируют уникальные условия и влияют на гидрологию болот.

Экологические исследования РАН

Тип болота	Доминирующие мхи	Регионы
Верховое	Сфагнум	Северо-Запад России
Низинное	Бриевые, Кукушкин лен	Подмосковье, Западная Сибирь
Переходное	Смесь сфагнум и бриевых	Центральная Россия

Мхи как среда обитания



Маленькие животные мхового ковра

В мхах обитают коловратки и клещи, живущие в постоянной влажности и защищённые от солнечных лучей. Эти микроорганизмы играют важную роль в мховом покрове.



Насекомые и их развитие в мхах

Личинки комаров предпочитают сфагновый покров для роста, используя влагу и защиту. Их присутствие влияет на экосистему и



Редкие растения в моховых условиях

Некоторые редкие болотные растения, такие как росянка, встречаются только в условиях высокой влажности, которую создают мхи. Они зависят от этих микроорганизмов для выживания.

Роль мхов в защите почвы и фильтрации воды

.1

Моховой покров прочно закрепляет верхний слой почвы, предотвращая её выветривание и смывание под воздействием дождя и ветра, что помогает сохранить плодородие и структуру грунта.

.2

Благодаря своей плотности и впитывающей способности мхи задерживают частицы почвы и металлы, препятствуя их попаданию в водные источники и снижая уровень загрязнения.

.3

В местах, где мхи отсутствуют, часто наблюдается вымывание питательных веществ, что приводит к деградации почв и ухудшению условий для роста растений и обитания животных.

Климатическая роль мхов: удержание углерода

.1

Функция накопления углерода

Мхи накапливают органический материал, образуя слой торфа, который удерживает углерод и снижает его выброс в атмосферу, тем самым уменьшая парниковый эффект.

.2

Влияние на глобальное потепление

Сфагновые мхи способны связывать до 40 грамм углекислого газа на квадратный метр ежегодно, что делает болота важными природными резервуарами углерода и помогает замедлить климатические изменения.



Мхи и поддержание водного баланса территории

Начало формирования мохового покрова

Появление мхов у водоёмов создает условия для удержания влаги и поддержания влажности почвы в прибрежной зоне.

Стабилизация водного стока и предохранение от катастроф


Моховой покров способствует медленному оттоку воды, уменьшая риски засух и наводнений в прилегающих районах и сохраняя экосистемы в равновесии.

Регулирование испарения и увлажнение воздуха

Мхи замедляют испарение воды из почвы и повышают влажность воздуха, создавая комфортные условия для жизни других организмов даже в сухие периоды.

Этапы формирования болота с участием МХОВ

Цикл образования болотной экосистемы



.1

Мхи замедляют разложение растительных остатков, что ведет к медленному восстановлению питательных веществ в почве и создаёт специфические условия для жизни болотных растений.

.2

Ограниченное поступление азота, фосфора и калия ограничивает конкуренцию между растениями, снижая их разнообразие и способствуя появлению специализированных видов.

.3

Растения-хищники, такие как росянка, успешно приспособились к дефициту питательных веществ, получая азот за счёт поедания насекомых.

.4

Это медленное обновление питательных веществ обеспечивает устойчивость болотных экосистем и сохраняет их уникальный растительный состав.

Цикл питательных веществ и мхи

Симбиотические связи мхов с другими организмами



Фиксация азота цианобактериями

Цианобактерии, обитающие на поверхности сфагнома, способны улавливать атмосферный азот и превращать его в форму, доступную для растений, обогащая почву важными элементами.



Грибные симбиозы с мхами

Грибы помогают расщеплять органический материал и высвобождать питательные вещества, тем самым способствуя росту мхов и поддерживая структуру болотной экосистемы.



Создание устойчивых пищевых цепей

Взаимодействие мхов с бактериями и грибами формирует основу питания для множества мелких животных, поддерживая живое разнообразие и стабильность болотных сообществ.

Основные угрозы болотным мхам

.1

Осушение земель и мелиорация нарушают влажность болот, вызывая гибель моховых покровов и ухудшая природные условия для обитателей этих экосистем.


.2

Добыча торфа разрушает естественные слои мха, уменьшая площадь болот и уничтожая местообитания для многих редких и уязвимых видов растений и животных.

.3


Рост городов и инфраструктуры фрагментирует болота, препятствуя миграции видов и снижая генетическое разнообразие мхов и связанных с ними организмов.

Охрана болотных мхов: примеры заповедников



Мшинское болото

Этот природный заповедник хранит редкие виды сфагнома и другие мхи, оберегая уникальные экосистемы и сохраняя биологическое разнообразие региона.



Национальный парк «Валдайский»

В парке проводятся мероприятия по сохранению болот, включая охрану мохового покрова и мониторинг состояния экосистем, способствующих устойчивому развитию территории.



Заповедник «Кологривский лес»

Здесь зафиксировано рекордное видовое разнообразие мхов в России, что делает заповедник ключевым объектом для научных исследований и природоохранной деятельности.

80%

болезней, связанных с загрязнением вод и нарушением климата, можно предотвратить путем сохранения болот и мховых экосистем.

Международный союз охраны природы (IUCN)

Сохранение мхов активно способствует устойчивости климата и чистоте водных ресурсов, поддерживая разнообразие экосистем, важное для здоровья человека и природы.

Мхи — основа жизни болотных экосистем

Эти растения играют ключевую роль в поддержании баланса воды, климата и биоразнообразия. Их охрана критически важна для будущего нашей планеты и требует совместных усилий общества и науки.