

Популяция — элементарная единица эволюции

Как меняется генофонд и почему это важно
для эволюции



Эволюция начинается с генофонда



Одна особь не меняет наследственный состав вида, а популяция — да: в ней перераспределяются аллели, накапливаются наследственные различия и действует отбор.

Evolution starts with the gene pool



Основные признаки популяции



Единый генофонд

Особи одной популяции свободно скрещиваются между собой, поэтому их наследственный материал образует общий генофонд и сохраняет относительную целостность группы.



Численность и плотность

Эти показатели отражают размер популяции и степень скученности особей. Они влияют на конкуренцию за ресурсы, устойчивость сообщества и вероятность случайных изменений генофонда.



Пространственные границы

Популяции занимают определённый ареал, но его границы не всегда чёткие. Они зависят от миграций, условий среды и особенностей размножения конкретного вида.



Структура по возрасту

Соотношение молодых, взрослых и старых особей показывает, способна ли популяция расти, сохранять численность или сокращаться в ближайшие поколения.



Разные уровни популяций

Выделяют локальные, экологические и географические популяции. Чем сильнее различаются условия среды и обмен особями, тем заметнее их отличия.

Показатели популяции и их биологическое значение



Показатель	Смысл	Влияние
Численность	Количество особей	Устойчивость
Плотность	Особей на площадь	Конкуренция
Миграции	Приток и отток	Состав генофонда
Возрастная структура	Соотношение возрастов	Перспектива роста

- + Основные параметры помогают оценить устойчивость популяции и скорость изменения её генофонда.
- + Показатели работают совместно: при изменении численности, плотности и миграций быстрее меняется и генетический состав популяции.
- Школьный курс биологии, раздел популяционной биологии

Движущие силы эволюции и их вклад в изменение генофонда




Диаграмма отражает не абсолютные величины, а сравнительную роль факторов: одни создают наследственные варианты, другие их закрепляют, выравнивают или разделяют популяции.

Наибольший вклад в направленное изменение дают мутации и отбор, тогда как дрейф, поток генов и изоляция определяют судьбу уже возникших вариантов.

Учебная схема по популяционной генетике, качественная оценка

Мутации как источник наследственной изменчивости ::::



Разные уровни изменений

Генные, хромосомные и геномные мутации затрагивают разные уровни наследственного материала. Они создают новые аллели и необычные сочетания признаков, из которых отбор может выбирать.



Случайность процесса

Возникновение мутаций не зависит от пользы для особи. С точки зрения эволюции это случайный, но постоянный источник наследственного разнообразия.



Большинство мутаций невыгодны

Чаще всего мутации оказываются нейтральными или вредными для организма. Полезные варианты редки, но именно они становятся важными при изменении условий среды.



Материал для отбора

Без мутаций не появились бы новые наследственные варианты. Поэтому они не сами создают адаптацию, а обеспечивают материал, на котором действует естественный отбор.

Естественный отбор и его формы

:::

Побеждает тот, кто лучше скрыт

На тёмной коре деревьев берёзовая пяденица с тёмной окраской становится менее заметной для птиц. Когда среда меняется, преимущество получает другой фенотип, и численность формы с более удачной окраской возрастает.



Среда меняет направление отбора

Если условия остаются стабильными, сохраняется средний вариант признака. При постепенном изменении среды отбор смещает норму в одну сторону, а при неоднородных условиях поддерживает крайние формы и ослабляет промежуточные.



Как действует естественный отбор в популяции

Схема отражает последовательность изменений генофонда и зависимость типа отбора от условий среды.

Борьба за существование как основа отбора

1

Внутривидовая конкуренция

Самая острая борьба происходит между особями одного вида: им нужны одни и те же ресурсы, территория и партнёры для размножения, поэтому конкуренция здесь особенно сильна.

2

Межвидовые отношения

Разные виды соперничают за пищу и пространство, а также вступают в отношения хищничества и паразитизма. Такие связи изменяют шансы выживания и размножения.

3

Дефицит условий среды

Недостаток воды, тепла, света, убежищ и пищи усиливает давление среды. В таких условиях выживают и оставляют потомство лишь наиболее приспособленные особи.

4

Основа естественного отбора

Борьба за существование не равна отбору, но именно она создаёт ситуацию, в которой признаки с разной полезностью по-разному влияют на успех особей.

Дрейф генов: случайные изменения генофонда

Случайное колебание аллелей

В малых популяциях частоты аллелей могут заметно меняться не из-за пользы признака, а случайно. Поэтому дрейф генов особенно силён при небольшой численности.

Эффект бутылочного горлышка

После резкого сокращения численности выживает лишь часть особей, и некоторые аллели исчезают случайно. Генетическое разнообразие популяции становится беднее.

Эффект основателя


Если новую территорию заселяет небольшая группа особей, она переносит только часть исходного генофонда. Новая популяция формируется на ограниченном наборе аллелей.

Поток генов и миграции



Перенос аллелей

Мигрирующие особи и гаметы переносят аллели из одной популяции в другую. Даже небольшой обмен наследственным материалом меняет частоты генов и делает соседние популяции генетически более похожими.



Обновление генофонда

Поток генов может приносить новые сочетания признаков, которых раньше не было в популяции. Это повышает разнообразие генофонда и иногда усиливает приспособленность к изменяющимся условиям среды.



Замедление расхождения

Если обмен генами между популяциями продолжается, их различия накапливаются медленнее. Постоянные миграции как бы «сшивают» популяции в более единое эволюционное целое и препятствуют быстрому разобщению.



Эффект изоляции

При длительном разрыве связи поток генов ослабевает или прекращается полностью. Тогда мутации, отбор и дрейф начинают действовать независимо, и популяции быстрее расходятся по наследственным признакам.

Изоляция как условие дивергенции

1

1. Географический барьер

Горы, реки, моря и другие преграды разобщают ареал вида. Популяции оказываются в разных условиях, а обмен генами между ними резко сокращается или становится невозможным.

2

2. Экологическая изоляция

Даже на одной территории особи могут использовать разные места обитания, пищевые ресурсы или экологические ниши. Тогда скрещивание происходит реже, и различия в генофонде начинают накапливаться.

3

3. Сезонные различия

Если сроки размножения не совпадают, популяции могут жить рядом, но не встречаться в период спаривания. Такая изоляция особенно заметна у видов с чётко выраженными сезонами размножения.

4

4. Поведенческие и механические барьеры

Различия в брачном поведении, сигналах, строении органов размножения или способах оплодотворения препятствуют успешному скрещиванию. Барьеры сохраняют самостоятельность популяций и уменьшают обмен аллелями.

5

5. Накопление различий

Чем дольше популяции изолированы, тем сильнее расходятся их генофонды. Мутации, дрейф и отбор действуют в них независимо, подготавливая почву для дивергенции и видообразования.



Рост генетических различий при изоляции




График показывает общий ход дивергенции: чем дольше популяции не обмениваются генами, тем меньше сходства сохраняется между их генофондами.

Постоянная изоляция усиливает расхождение популяций, а миграции и скрещивание удерживают различия на низком уровне и замедляют эволюционное разделение.

Схематические данные по школьному курсу биологии, популяционная генетика

Формы естественного отбора и их результаты

- Школьный курс биологии, раздел «Эволюция»

Тип	Условия	Результат
Стабилизирующий	Постоянные	Средний признак
Движущий	Меняющиеся	Сдвиг нормы
Разрывающий	Неоднородные	Крайние варианты

Сравнение показывает, как по-разному отбор действует в зависимости от условий среды и какие варианты признака сохраняются в популяции.

Характер среды определяет направление отбора: при стабильности сохраняется средний вариант, при изменении среды – новый, а при неоднородности – крайние фенотипы.

Популяционная структура вида

1. Мозаика популяций

1

Один вид обычно представлен множеством локальных популяций. Каждая из них живёт в своей части ареала и имеет собственные особенности численности, состава и приспособленности.

2. Связь и различия

2

Популяции могут обмениваться особями, поэтому вид остаётся единым, но при этом локальные группы нередко различаются частотами аллелей, темпами размножения и реакцией на среду.

3. Эволюционный резерв

3

Разнообразие популяций повышает устойчивость вида. Если одна группа сильнее страдает от засухи, холода или хищников, другие могут сохранить численность и поддержать дальнейшее существование вида.

Примеры микроэволюции в популяциях :::



+ Антибиотикорезистентность бактерий

В популяции бактерий после применения антибиотика выживают устойчивые особи. Их доля быстро растёт, поэтому прежние чувствительные варианты становятся всё менее заметными.

+ Устойчивость насекомых

При многократной обработке инсектицидами сохраняются насекомые с наследственной устойчивостью. Отбор действует очень быстро, и препарат постепенно теряет эффективность для всей популяции.

+ Берёзовая пяденица

Изменение окраски у берёзовой пяденицы связано с преимуществом лучше замаскированных особей. Когда среда меняется, преимущество получает другой фенотип, и состав популяции сдвигается.


+ Островные формы

На островах изолированные популяции нередко изменяют размеры тела, форму клюва или другие признаки. Такие сдвиги происходят постепенно и отражают действие отбора в особых условиях среды.

От микроэволюции к новому виду

Схема показывает, как наследственные изменения в изолированных популяциях постепенно приводят к образованию нового вида.

Сравнение роли основных движущих сил эволюции



Разные факторы не заменяют друг друга: один создаёт наследственные варианты, другой закрепляет удачные, третий случайно меняет частоты, а остальные регулируют обмен и расхождение популяций.

Эволюция идёт не под действием одного механизма, а через совместную работу нескольких факторов, каждый из которых выполняет собственную функцию в изменении генофонда.

Схема по материалам школьного курса биологии

Значение популяционного подхода в биологии



Понимание адаптации

Популяционный подход помогает объяснить, почему одни признаки закрепляются, а другие исчезают. Он связывает наследственную изменчивость, отбор и условия среды в единую картину развития живых организмов.



Объяснение биоразнообразия

Различия между популяциями показывают, как возникают локальные адаптации и как из них складывается разнообразие видов. Это позволяет рассматривать эволюцию как процесс накопления изменений в поколениях.



Практика селекции

В селекции знание генофонда помогает отбирать полезные наследственные варианты и создавать породы и сорта с нужными свойствами. Без популяционного анализа трудно оценить устойчивость и продуктивность.



Охрана редких видов

Для сохранения малочисленных видов важно учитывать сокращение численности, потерю генетического разнообразия и риск инбридинга. Популяционный анализ помогает выбирать меры охраны более точно.



Медицина и эпидемиология

Популяционные закономерности нужны для изучения устойчивости бактерий к лекарствам и распространения инфекций. Они позволяют прогнозировать, как изменяются свойства популяций микроорганизмов под действием отбора.

Популяция: где начинается эволюция

Именно в популяции меняются частоты аллелей, поэтому она служит элементарной единицей эволюции. Мутации создают наследственное разнообразие, отбор его упорядочивает, а остальные факторы направляют дальнейшие изменения.