



Сукцессия: основные понятия и значимость

Сукцессия — ключевой процесс
эволюции экосистем во времени.



Основы концепции сукцессионных изменений

Сукцессия — это серия последовательных изменений биологических сообществ после экологических perturbations, сформулированная Вармингом и Клементсом. Она лежит в основе понимания динамики природы и восстановления экосистем.



Что такое сукцессия? Определение и суть

Сукцессия представляет собой необратимый процесс смены состава и структуры живых сообществ на определённой территории во времени методичным порядком, отражая закономерности экологии.

Она подразделяется на последовательные этапы, формирующие сукцессионный ряд, ведущий к формированию устойчивого и сбалансированного климакс-сообщества.

Данный процесс универсален для всех природных зон и играет центральную роль в поддержании природного равновесия и биоразнообразия.

Первичная сукцессия: начало жизни на пустом субстрате

1 Жизнь на недавно образованном вулканическом острове

На молодых лавовых полях, только что сформировавшихся после извержения, лишайники и мхи начинают колонизацию, создавая первые слои почвы, что содействует дальнейшему развитию растительности.




2 Формирование почвенного покрова на песчаных дюнах

Песчаные дюны, лишённые растительности, первым этапом заселяют бактерии и водоросли, что способствует накоплению органических веществ и улучшению условий для последующих растений.



3 Колонизация скальных обнажений

На каменистых поверхностях первыми поселенцами становятся микроорганизмы и простейшие растения, медленно трансформирующие окружающую среду для развития более сложных сообществ.



Вторичная сукцессия: восстановление нарушенных сообществ



Восстановление леса после вырубki

После лесозаготовок почва остаётся, позволяя быстро развиваться травянистой растительности, затем кустарникам и молодым деревьям, что приводит к постепенному возвращению лесного покрова.



Заращение кюветов и заброшенных лугов

После прекращения сельскохозяйственного использования места с травянистой растительностью постепенно заменяются кустарниками, а со временем появляются древесные растения, восстанавливая природную экосистему.




Восстановление после пожаров в лесах

Пожар оставляет плодородную почву и семена в почве, что обеспечивает быстрое возобновление травянистых растений, с последующим ростом кустарников и молодых деревьев.

Стадии сукцессии: схема и характеристика

Основные этапы развития биоценозов



Примеры смены видов в сукцессионном ряду

Пионерные виды — бактерии, лишайники и мхи — первыми колонизируют экстремальные среды, способствуя формированию почвы и подготовке условий для других растений.

На промежуточных стадиях появляются однолетние растения, злаки и разнотравье, которые увеличивают растительное разнообразие и усложняют структуру сообщества.

В дальнейшем кустарники занимают значительные площади, обеспечивая укрытие и ресурсы для новых видов и продвигая дальнейшую смену экосистемы.

Финальным этапом становится формирование лесного или степного климакса с доминированием долгоживущих деревьев и устойчивым биоценозом.

Различия первичной и вторичной сукцессии

Характеристика	Первичная сукцессия	Вторичная сукцессия
Почва	Отсутствует, формируется заново	Сохраняется, семена и корни остаются
Длительность	100–1000 лет	20–200 лет
Начальный субстрат	Пустой, негодный для жизни	Нарушенный, но удобренный почвой
Примеры	Вулканический остров	Заброшенные пашни, пожары



Основные характеристики и примеры первичной и вторичной сукцессий представлены в таблице.

Ключевое отличие — длительность и начальные условия, что существенно влияет на скорость восстановления.

Климакс: конечная фаза сукцессии

Климакс — стабильное и устойчивое сообщество, достигшее максимального развития по структуре и видовому составу, где процессы роста и распада сбалансированы.



В таких сообществах многоуровневая пищевая сеть и минимальная инвазия новых видов обеспечивают долгосрочную экосистемную стабильность и сопротивляемость изменениям.




Примерами служат старовозрастные леса, реликтовые дубравы и степные участки с устойчивым травостоем, сохраняющие биологическое равновесие.




Антропогенное влияние на сукцессию



Человеческая деятельность способна направлять и ускорять сукцессию через искусственные мероприятия: посадку лесов, восстановление болота и зарыбление водоемов.



Создание агроэкосистем и охранных территорий позволяет контролировать экосистемные процессы и сохранять биоразнообразие в различных ландшафтах.



Однако техника, минеральные удобрения и пестициды часто нарушают естественные циклы и структуру сообществ, снижая их устойчивость.



Различия в успехах реставрационных проектов показывают необходимость комплексного подхода к использованию сукцессионных знаний в природопользовании.

Конкретные примеры восстановительной сукцессии

1 Восстановление дерновинных лугомест

На дерновинных лугах без активного вмешательства природные сообщества трав постепенно сменяются древесным ярусом на протяжении 30-40 лет. Этот процесс сопровождается увеличением видового разнообразия и образованием сложной структуры

растительности.



2 Регенерация леса после пожаров

После лесных пожаров в смешанных лесах восстановление древесного покрова занимает 60-80 лет. Восстанавливаются связи между организмами, формируются новые трофические сети, что способствует устойчивости экосистемы.



3 Смена растительности на вырубках

На местах недавних вырубок вторичная сукцессия приводит к быстрой колонизации злаками и кустарниками, что способствует последующему возобновлению лесных участков в естественном порядке.



Динамика и структура сукцессионных изменений

В течение сукцессии растёт видовое разнообразие, расширяется экологическая ниша, формируются новые взаимоотношения между организмами и трофические сети.



Параллельно увеличивается биомасса, меняются физико-химические параметры почвы, такие как влажность и кислотность, что влияет на общее функционирование экосистемы.



После формирования климакс-сообщества интенсивность изменений снижается, достигается стабильное состояние с устойчивым балансом процессов в экосистеме.



Изменение структуры видов на разных этапах сукцессии




Пионерные виды-колонизаторы

Лишайники, мхи и бактерии первыми заселяют новые или нарушенные территории. Они способны выживать в экстремальных условиях и создают условия для последующих растений за счёт накопления органического вещества.



Промежуточные сообщества

Со временем появляются однолетние растения, злаки и кустарники, которые увеличивают биологическое разнообразие, образуют более сложные структуры и интерактивные сети в экосистеме.



Формирование климаксовых сообществ

На завершающих этапах сменяются долгоживущие древесные растения, которые образуют устойчивые лесные или степные сообщества с устойчивой пищевой сетью и высокой сложностью.

Экологическое и практическое значение сукцессии

Сукцессия способствует сохранению и увеличению биологического разнообразия, создавая разнообразные экологические ниши и устойчивые сообщества.

Процессы со сменой растительности стабилизируют почвы и регулируют ключевые циклы веществ, обеспечивая долгосрочную продуктивность экосистем.

Экосистемы, сформировавшиеся в результате сукцессии, обладают высокой устойчивостью к природным и антропогенным возмущениям.

Понимание сукцессии применяют в восстановлении разрушенных ландшафтов, озеленении городов и мелиорации деградированных земель, повышая эффективность природоохранных мероприятий.

Практическое использование знаний о сукцессии

1 Агроэкология и устойчивость земель

В агроэкологии изучение сукцессии помогает оценивать потенциальную продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных угодий, планируя рациональное использование и минимизируя деградацию.




2 Рекультивация нарушенных территорий

При восстановлении карьеров и отходов промышленности используют последовательное заселение растениями, начиная с пионерных видов, что способствует постепенному восстановлению экосистемы.



3 Озеленение и ландшафтный дизайн

При планировании зелёных насаждений в городах и охране природных территорий применяются принципы сукцессии для создания устойчивых и самовосстанавливающихся ландшафтов на примере Куршской косы.




Динамика биоразнообразия при сукцессии

По мере развития экосистемы происходит быстрый рост числа видов с начального малого количества до высокой устойчивой численности в климакс-сообществе.



Данные демонстрируют, что биологическое разнообразие достигает максимума и стабилизируется на поздних стадиях сукцессии, отражая устойчивость экосистем.



Учебные пособия по экологии, 2022

Сукцессия в управлении природными территориями

Знание законов сукцессии помогает прогнозировать восстановление экосистем после различных нарушений, выбирая оптимальные методы регенерации.

Методы ускоренной рекультивации включают стимулирование естественных процессов смены сообществ и контроль за инвазивными видами.

Эффективное управление лесами и лугами после пожаров и сельскохозяйственной деятельности способствует сохранению биоразнообразия и экосистемных функций.

Влияние изменения климата на сукцессионные процессы

Повышение температуры и нестабильность осадков изменяют скорость смены сообществ, ускоряя или замедляя процессы сукцессии в разных регионах.



В ряде территорий появляются новые виды и сообщества, ранее нехарактерные для данного климата, изменяя состав экосистем и их устойчивость.



В некоторых случаях происходит более быстрое восстановление экологического равновесия, хотя в других — возможна деградация и потеря биоразнообразия.



Исторические примеры сукцессии: остров Кракатау



Первичные стадии колонизации

Сразу после извержения остров был полностью стерилен. Первые заселители — бактерии и лишайники — обосновались на лавовых полях, начав формировать почвенный покров для других организмов.



Появление трав и кустарников

Со временем появились травянистые растения, которые подготовили среду для кустарников и молодых деревьев, постепенно увеличивая разнообразие и сложность растительных сообществ.



Формирование зрелых экосистем

Через десятилетия на острове сформировались устойчивые леса с разнообразием видов деревьев, птиц и насекомых, что подтверждает последовательность и устойчивость сукцессии.

Ключевая роль сукцессии в будущем природы планеты

Сукцессия – фундаментальный процесс восстановления и поддержания экосистем, необходимый для сохранения природного баланса и устойчивого развития в условиях современных экологических вызовов.

