


Обзор и ключевые темы: строение клетки



Клетка — основа жизни, включающая мембрану, ядро, цитоплазму и органеллы.

История открытия клетки

Открытие клетки связано с Робертом Гуком в 1665 году. В XIX веке Шлейден и Шванн сформировали клеточную теорию, заложив основы современной биологии и генетики.




Виды клеток: прокариоты против эукариотов



Прокариотические клетки

Прокариоты — простейшие организмы без ядра, их ДНК расположена в нуклеоиде. К ним относятся бактерии и археи, имеющие плазматическую мембрану и рибосомы, но без мембранных органелл.



Эукариотические клетки

Эукариоты имеют оформленное ядро, окружённое ядерной оболочкой. Эти клетки сложнее и содержат разнообразные органеллы, включая митохондрии и аппарат Гольджи, что характерно для растений, животных и грибов.

Клеточная мембрана: строение и функции

Мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов с интегральными и периферическими белками, обеспечивая структурную устойчивость клетки.

Главная функция – избирательная проницаемость, позволяющая контролировать вход и выход веществ, поддерживая внутренний гомеостаз.

Мембрана участвует в восприятии внешних сигналов и передаче информации внутрь клетки через специфические рецепторы.

Она также обеспечивает межклеточные взаимодействия, способствуя связыванию клеток в ткани и формированию тканей.


Жидкостно-мозаичная модель мембраны

Расположение и подвижность белков

Белки мембраны интегрированы или прикреплены периферически, способны к латеральному движению, что обеспечивает пластичность мембранной структуры.

Роль углеводных компонентов и асимметрия

Гликолипиды и гликопротеины служат для клеточной идентификации и передачи сигналов; мембрана обладает асимметричным распределением компонентов.



Сравнительный анализ процессов транспорта через мембрану

Сравнение пассивного и активного транспорта по ключевым параметрам и примерам.

Активный транспорт обеспечивает направление веществ против концентрационного градиента с затратами энергии, в отличие от пассивного движения.

Тип транспорта	Механизм	Энергозатраты	Примеры
Пассивный	Движение по градиенту концентрации	Отсутствуют	Диффузия кислорода, осмос воды
Активный	Перемещение против градиента	Требуется АТФ	Ионные насосы Na ⁺ /K ⁺ , транспорт глюкозы

Учебная литература по клеточной биологии, 2023

Функции клеточных органелл



Митохондрии синтезируют АТФ посредством окислительного фосфорилирования, обеспечивая энергию для клеточных процессов.



Эндоплазматическая сеть состоит из шероховатой (синтез белков) и гладкой (синтез липидов, детоксикация), поддерживая метаболизм клетки.



Аппарат Гольджи отвечает за сортировку и упаковку молекул, а клеточный центр организует микротрубочки и участвует в делении клетки.

Ядро: строение и компоненты




Ядро окружено двойной мембраной с порами, регулирующими обмен веществ между ядром и цитоплазмой.

Внутри находится кариоплазма и ядрышко, где происходит синтез рибосомной РНК для образования рибосом.

Ядро содержит хромосомы с ДНК, несущей наследственную информацию и управляющей жизнедеятельностью клетки.


Ядерная оболочка обеспечивает защиту и структурную организацию генетического материала в клетке.

Геном клетки: состав и значение



Состав генома

Геном включает ядерную ДНК, а также внеклеточную ДНК — митохондриальную у животных и хлоропластную у растений, задавая основу наследственности и клеточных функций.



Роль генома в функционировании клетки

Геном кодирует белки и регулирует наследственные признаки. Мутации в геноме могут вызывать заболевания, поэтому его стабильность критически важна для здоровья организма.

Хромосомы: сравнение эукариот и прокариот



Базы данных геномных исследований, 2023

- Прокариоты имеют компактный геном в виде кольцеобразной хромосомы, в то время как эукариоты обладают множеством линейных хромосом.
- Разные типы клеток отличаются масштабом и организацией генома, что отражает уровень их биологической сложности.

Функции цитоплазмы и цитоскелета



Среда для реакций и транспорта

Цитоплазма обеспечивает оптимальные условия для многочисленных биохимических реакций и транспортировки веществ внутри клетки, способствуя эффективной работе органелл и обмену энергией.



Поддержка клеточной формы

Цитоскелет образован сетью микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов, которые поддерживают форму клетки и обеспечивают прочность её структуры.



Участие в делении и движении

Структуры цитоскелета играют ключевую роль во внутриклеточном движении, образовании веретена деления и обеспечении подвижности клетки в ответ на внешние стимулы.

Цитозоль и органоиды цитоплазмы



Цитозоль — жидкая матрица клетки

Цитозоль — это водная среда, в которой растворены белки, ионы и питательные вещества. Она заполняет пространство между органеллами и участвует в обмене веществ и химических реакциях.

Функции органоидов в цитоплазме

Органоиды цитоплазмы выполняют специализированные функции: митохондрии синтезируют энергию, эндоплазматическая сеть участвует в синтезе и транспорте веществ, лизосомы обеспечивают утилизацию, а пероксисомы — защиту от токсинов.

Клеточный центр: структура и роль в делении клетки

01

Клеточный центр содержит две центриоли, расположенные перпендикулярно, окружённые перичентриольным материалом, где организуются микротрубочки цитоскелета.


02

Он служит основным центром организации микротрубочек, формируя каркас для внутренней структуры клетки и обеспечивая её механическую прочность.

03

При митозе и мейозе клеточный центр контролирует формирование веретена деления, что обеспечивает правильное распределение хромосом между дочерними клетками.

Рибосомы: строение и функции



Двухсубъединичная структура рибосом

Рибосомы состоят из большой и малой субъединиц, каждая из которых содержит рибосомную РНК и белки. Такая конструкция позволяет эффективно читать информацию с иРНК и синтезировать белки.



Размещение и функция рибосом в клетке

Рибосомы могут находиться как свободно в цитоплазме, так и прикрепляться к эндоплазматической сети. Они осуществляют трансляцию — сборку аминокислот в полипептидные цепи согласно генетической информации.

Сравнение рибосом прокариотов и эукариотов

Параметр	Прокариоты	Эукариоты
Размер комплекса	70S (30S + 50S)	80S (40S + 60S)
Локализация	Цитоплазма	Цитоплазма и ЭПР
Чувствительность к антибиотикам	Высокая (тетрациклин)	Отсутствует или низкая
Белковый состав	Меньше белков	Больше белков

Источник: учебник клеточной биологии

Таблица отображает размеры, состав и особенности функционирования рибосом двух типов клеток, подчеркивая различия в структуре и чувствительности к антибиотикам.


Рибосомы прокариотов и эукариотов отличаются по размеру, составу и лекарственной чувствительности, что важно для разработки антибактериальной терапии.

Взаимосвязь клеточных компонентов

Клеточная мембрана контролирует вход и выход веществ, обеспечивая защиту и связь с внешней средой.	Ядро содержит генетический материал, управляя синтезом белков и регуляцией клеточных функций.
Рибосомы реализуют информацию из ядра, синтезируя необходимые белки для функционирования клетки.	Обмен веществ и энергии между органеллами поддерживает гомеостаз и жизнедеятельность клетки в целом.

Поток информации: от ДНК к белку

Последовательность биомолекулярных процессов в клетке



Роль клеточной мембраны в взаимодействии клеток




.....○ Мембрана формирует специализированные межклеточные соединения, обеспечивая прочность и целостность тканей через десмосомы и щелевые контакты.

.....○ Она участвует в приеме и передаче химических сигналов, регулируя реакцию клетки на изменения внешней среды и обеспечивая коммуникацию.


.....○ Мембранные белки выполняют роль рецепторов и маркеров, играющих важную роль в иммунном ответе и распознавании собственных и чужеродных клеток.

Патологии, связанные с нарушением строения клеточных компонентов




Муковисцидоз: дефект мембранных каналов

Генетическая мутация в белке CFTR приводит к нарушению работы мембранных ионных каналов, вызывая нарушение транспорта хлоридов и образование густой слизи в органах дыхания и пищеварения.



Митохондриальные болезни и энергетический дефицит

Дефекты в ферментах дыхательной цепи митохондрий приводят к снижению синтеза АТФ, что вызывает разнообразные синдромы, включая мышечную слабость и неврологические расстройства.



Аномалии рибосом и заболевания

Нарушение сборки рибосом связано с развитием анемий и нейродегенеративных заболеваний, так как страдает синтез белков, жизненно важных для клеточного метаболизма.

Значение изучения клетки в современной биологии

Понимание клеточной структуры и функции — фундамент науки о жизни, открывающий возможности для прогресса в медицине и биотехнологиях, а также формирующий критическое мышление у будущих специалистов.