



Изучаем ключевые клеточные структуры и их роль в жизнедеятельности клетки.




Строение эукариотической клетки: ключевые органоиды и их значение

История и развитие клеточной теории



Клеточная теория, сформулированная в XIX веке, опирается на открытия Р. Гука и А. Левенгука. Эволюция микроскопии позволила раскрыть структуру и функции органоидов, что стало фундаментом для биологии и медицины.

Основные признаки эукариотической клетки



Ядро как ключевой отличительный признак

Эукариотические клетки содержат ядро — центр управления клеточными процессами, что отличает их от прокариотов. Ядро окружено мембраной и содержит генетический материал.



Мембранные органеллы и их значение

Эукариоты имеют сложную систему мембранных органелл: эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, лизосомы. Эти структуры обеспечивают разделение функций и оптимизацию метаболизма.



Цитоплазма и биохимическая активность

Цитоплазма содержит органоиды и ферменты, обеспечивающие обмен веществ. Пространственная организация повышает эффективность биохимических реакций внутри клетки.

01

ЭПС — система мембранных трубочек и цистерн в цитоплазме, делится на шероховатую и гладкую, отличающиеся наличием рибосом.

02

Шероховатая ЭПС участвует в синтезе и первичной модификации белков, гладкая синтезирует липиды и углеводы.

03

Сеть транспортирует синтезированные молекулы к другим органоидам и депонирует кальций для регуляции клеточной деятельности.

04

Гладкая ЭПС также обезвреживает вредные вещества, выполняя функцию детоксикации в клетках печени.


Эндоплазматическая сеть: определение и функции

Особенности шероховатой эндоплазматической сети



Роль рибосом на поверхності ЕПС

На мембранах гранулярної ЕПС розположені рибосоми, де відбувається синтез білків, призначених для мембран, лізосом або виділення назовні. Це забезпечує специфічність виробництва білків.



Функції в спеціалізованих клітках


Шероховата ЕПС особливо розвита в секреторних клітках — підшлудочної залози, плазматических клітках. Вона формує везикули для транспорту білків до комплексу Гольджі і далі.

Характеристика гладкой эндоплазматической сети



Синтез липидов и участие в метаболизме

Гладкая ЭПС отвечает за производство фосфолипидов, стероидов и гликогена. Она способствует поддержанию целостности мембран и запасу энергии в клетке.



Детоксикация и депонирование кальция

В клетках печени гладкая ЭПС обезвреживает токсичные химические соединения. Кроме того, она аккумулирует ионы кальция, регулируя внутриклеточные сигналы и процессы.

Сравнительный анализ функций гранулярной и агранулярной ЭПС

Гранулярная ЭПС преимущественно синтезирует белки, гладкая — липиды и участвует в клеточных обменах.

Функциональное разделение ЭПС обеспечивает эффективное выполнение разнообразных клеточных задач.

Комплекс Гольджи состоит из 6–8 уплощённых цистерн, окружённых везикулами, и расположен рядом с ЭПС и ядром клетки.




6–8

цистерн формируют стопку мембран, обеспечивающую обработку и сортировку макромолекул в клетке.


Молекулярная биология клетки, 2019

Ключевые функции комплекса Гольджи



Модификация и сортировка биомолекул

Комплекс Гольджи завершает посттрансляционную модификацию белков и липидов: гликозилирование, фосфорилирование. Он подготавливает молекулы для следующих этапов клеточного обмена.




Упаковка и транспортировка веществ

Гольджи формирует везикулы для доставки макромолекул к лизосомам, клеточной мембране или на экспорт, участвует в секреции у животных и формировании клеточной стенки у растений.

Путь белка от синтеза до секреции

Источник: Современные учебные материалы по клеточной биологии



01

Лизосомы — сферические органоиды с единственной фосфолипидной мембраной, содержащей комплекс гидролитических ферментов, которые активны при кислой внутренней среде с pH около 5.


02

Ферментативный состав лизосом обеспечивает расщепление разнообразных макромолекул, включая белки, липиды и полисахариды, создавая основу внутриклеточного пищеварения.


03

Эти органоиды формируются из аппарата Гольджи и наиболее распространены в животных клетках, где выполняют важные функции регенерации и защиты.

Лизосомы: строение и особенности



Функции лизосом в клеточном метаболизме и защите




Внутриклеточное пищеварение и переработка

Лизосомы осуществляют расщепление крупных молекул и изношенных органоидов, способствуя обновлению цитоплазматических компонентов и поддержанию гомеостаза клетки.



Аутофагия — регуляция клеточного обновления

Органоиды участвуют в аутофагии, при которой собственные поврежденные структуры клетки перевариваются, предотвращая накопление дефектных элементов и стимулируя восстановительные процессы.



Защита от чужеродных агентов

Лизосомы обнаруживают и разрушают бактериальные и вирусные компоненты, реализуя механизм клеточного иммунитета и предотвращая повреждение тканей инфекционными агентами.

Сравнительная характеристика лизосом, ЭПС и комплекса Гольджи

Органоид	Структура	Основные функции	Происхождение	Локализация
Лизосомы	Мембрана, гидролитические ферменты	Деградация, аутофагия	Аппарат Гольджи	Цитоплазма вблизи Гольджи
ЭПС	Сеть мембран, цистерн и трубочек	Синтез белков и липидов, транспорт	Клеточная мембрана и ядро	Распределена в цитоплазме
Комплекс Гольджи	Уплощённые цистерны, везикулы	Модификация, сортировка и транспорт	ЭПС	Рядом с ядром и ЭПС

Таблица отражает структурные особенности, основные функции, происхождение и локализацию трёх ключевых органоидов эукариотической клетки.

Каждый органоид обладает уникальной структурой и специализированными функциями, обеспечивающими согласованную работу клетки.

Клеточные включения: определение, типы и функции

01

Клеточные включения — непостоянные немембранные структуры, которые включают капли жиров, гранулы гликогена, кристаллы и пигментные гранулы, разнообразные по составу и предназначению.

02

Они выполняют функцию накопления запасных питательных веществ или временных продуктов метаболизма, играя роль в энергетическом и структурном обеспечении клетки.

03

Клеточные включения не имеют собственной мембраны и отражают метаболические особенности разных типов клеток и организмов.

Примеры клеточных включений у животных и растений



Гликогеновые гранулы в животных клетках

Гранулы гликогена являются основным запасом углеводов в мышцах и печени животных, обеспечивая быструю мобилизацию энергии при повышенной потребности организма.



Жировые капли и пигментные гранулы

Жировые капли накапливаются в адипоцитах для энергоёмкого хранения, а меланиновые гранулы в коже и глазах выполняют фотозащитную и окрашивающую функцию.



Крахмальные зерна и кристаллы в растениях

Растительные клетки содержат крахмальные зерна, служащие запасом углеводов, а также кристаллы оксалата кальция, играющие роль в поддержании структурной стабильности тканей.

Биологическая роль клеточных включений

01

Включения обеспечивают запас энергии: гликоген и крахмал используются клеткой в периоды повышенного энергетического спроса.

02

Жировые капли служат долговременным источником калорий, продолжая обеспечивать клетки энергетическими резервами.

03

Пигментные включения ответственны за окраску тканей, выполняя функции маскировки, привлечения или защиты от ультрафиолета.

04

Некоторые метаболические продукты аккумулируются во включениях временно, нейтрализуясь или мобилизуясь по необходимости.

Процентное соотношение компонентов клетки

Наибольший вклад в массу клетки вносит вода, обеспечивая среду для биохимических реакций и поддержание структурной гибкости.

Преобладание воды и белков указывает на основу клетки как динамической системы, где вода играет роль растворителя, а белки обеспечивают функциональность.

Взаимодействие органоидов: координация процессов в клетке

01


Эндоплазматическая сеть синтезирует биополимеры и передаёт их транспортными пузырьками к комплексу Гольджи для дальнейшей обработки.

02

Комплекс Гольджи выполняет модификацию и сортировку веществ, направляя их в нужные клеточные отделы или на экспорт наружу.

03

Лизосомы обеспечивают утилизацию и переваривание веществ, регулируя внутриклеточный обмен и устраняя повреждённые компоненты.



Патологии, связанные с нарушениями работы органоидов




01

Нарушения в работе лизосом приводят к накоплению токсичных веществ в клетках, например, при болезни Тея–Сакса, вызывая тяжелые неврологические симптомы.

02

Дефекты ЭПС и комплекса Гольджи нарушают синтез и транспорт белков, что характерно для муковисцидоза, существенно влияющего на функции органов и системы.



Значимость органоидов для жизнедеятельности клетки и здоровья организма

Комплексное функционирование органоидов обеспечивает целостную работу клетки, а понимание их роли критично для диагностики и лечения заболеваний на клеточном уровне.