



Биосинтез белков: + как клетка получает рабочий белок из гена

От ДНК к белку: путь наследственной информации к клеточной функции.

Зачем изучать биосинтез белков



Биосинтез белков показывает, как записанная в ДНК информация превращается в признаки организма. Он объединяет генетику, цитологию и молекулярную биологию, объясняя работу ферментов, наследование, наследственные болезни и основы биотехнологии.

Центральная догма молекулярной биологии

01.

Поток информации

В клетке наследственная информация обычно передаётся в направлении ДНК → РНК → белок. ДНК хранит исходную запись, РНК служит промежуточной копией, а белок становится рабочей молекулой.

02.

Роль ДНК

Последовательность нуклеотидов в ДНК определяет порядок нуклеотидов в РНК, а затем и порядок аминокислот в полипептиде. Поэтому даже небольшое изменение в гене может изменить свойства белка.

03.

Исключение из правила

У некоторых вирусов, например ретровирусов, информация может переписываться с РНК на ДНК. Это называется обратной транскрипцией и показывает, что биологические процессы могут иметь особые варианты.

04.

Почему это важно

Центральная догма помогает понять, как молекулярные изменения на уровне гена становятся причиной изменений структуры, активности и функции белка, а значит — и признаков клетки или организма.

Основные молекулы биосинтеза и их функции

Молекула	Функция
ДНК	Матрица
мРНК	Кодоны
тРНК	Доставка аминокислот
рРНК	Основа рибосомы
Аминоацил-тРНК-синтетаза	Зарядка тРНК

Кратко сопоставим участников процесса и их вклад в точность синтеза белка.

Точность синтеза обеспечивается совместной работой матрицы, переносчиков информации, рибосомы и ферментов, распознающих нужную аминокислоту.

Учебный курс молекулярной биологии и школьная программа по биологии

Транскрипция: синтез первичной РНК на матрице ДНК

Старт на промоторе

- РНК-полимераза узнаёт промотор и связывается с ним, после чего локально раздвигает цепи ДНК. Так открывается участок гена, с которого будет считана информация.

Комплементарное копирование

- Фермент строит РНК по принципу комплементарности, используя одну из цепей ДНК как матрицу. Синтез всегда идёт в направлении $5' \rightarrow 3'$, что важно для дальнейшей обработки.

Первичный транскрипт

- У эукариот сначала образуется первичная РНК, в которой присутствуют и экзоны, и интроны. Это ещё не готовая мРНК, а исходный продукт транскрипции.

Зачем нужен процесс

- Транскрипция создаёт копию гена, которую можно использовать дальше без повреждения самой ДНК. Именно с этого этапа начинается перенос наследственной информации к месту синтеза белка.



Созревание мРНК у эукариот

Последовательность посттранскрипционных изменений первичного транскрипта перед выходом в цитоплазму.




Генетический код и его свойства



Триплетность

Каждый кодон мРНК состоит из трёх нуклеотидов. Именно такая длина позволяет клетке однозначно считывать информацию и связывать её с одной аминокислотой или сигналом завершения.



Вырожденность

Одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими разными кодонами. Это свойство повышает устойчивость к отдельным изменениям в последовательности нуклеотидов.



Почти универсальность

Для большинства организмов генетический код одинаков или очень близок. Благодаря этому гены одних видов можно использовать в клетках других видов в биотехнологии.



Старт и стоп

Кодон AUG обычно задаёт начало трансляции и кодирует метионин, а UAA, UAG и UGA останавливают синтез. Так клетка точно определяет границы белковой последовательности.

Этапы трансляции и затраты энергии



Элонгация требует больше всего ресурсов, потому что рибосома многократно продвигается по мРНК и присоединяет аминокислоты к растущей цепи.

Главный энергетический расход связан с удлинением белка; точность контроля на каждом шаге защищает клетку от опасных ошибок.

Обобщение школьного курса молекулярной биологии; качественная сравнительная схема

Рибосома как центр синтеза белка



Две субъединицы

Рибосома состоит из малой и большой субъединиц, образованных рРНК и белками. Такое устройство позволяет одновременно считывать информацию и соединять аминокислоты в цепь.



Функции участков

Малая субъединица связывается с мРНК и контролирует соответствие кодонов, а большая субъединица катализирует образование пептидной связи. Таким образом, рибосома объединяет чтение и сборку белка.




Различия у организмов

У прокариот рибосомы имеют коэффициент седиментации 70S, у эукариот — 80S. Это различие используют некоторые антибиотики, избирательно действующие на бактериальные рибосомы.

Инициация трансляции

Схема показывает ранние события сборки рибосомного комплекса на мРНК у прокариот и эукариот.



Элонгация: удлинение полипептидной цепи

Образование пептидной связи

Большая субъединица рибосомы катализирует соединение аминокислот. Рибосомная рРНК действует как фермент и переносит растущую цепь на новую тРНК.

Вход аминоацил-тРНК

Новая тРНК с аминокислотой распознаёт следующий кодон мРНК и входит в А-центр рибосомы, если антикодон точно комплементарен.


Повторение цикла

Эти действия многократно повторяются, поэтому полипептид быстро удлиняется. Процесс продолжается до тех пор, пока рибосома не достигнет стоп-кодона.

Сдвиг рибосомы

После реакции рибосома продвигается по мРНК ровно на один кодон, освобождая прежнюю тРНК и подготавливая следующий участок для считывания.

Сравнение биосинтеза белка у прокариот и эукариот



Главное различие связано с организацией клетки: наличие ядра у эукариот делает путь от гена до белка длиннее и многоступенчатее.

У прокариот синтез быстрее и проще, а у эукариот — точнее регулируется и включает больше этапов обработки РНК.

Терминация трансляции и освобождение готового белка

01.

Стоп-кодон в А-центре

Когда в А-центр рибосомы попадает UAA, UAG или UGA, соответствующая тРНК не присоединяется. Это служит сигналом остановки и завершения синтеза полипептида.

02.

Факторы терминации

Вместо тРНК к рибосоме связываются белковые факторы терминации. Они запускают отделение готовой цепи от комплекса и помогают освободить синтезированный белок.

03.

Разборка рибосомы

После высвобождения полипептида рибосома распадается на малую и большую субъединицы. Затем они могут снова участвовать в новом цикле трансляции.



Посттрансляционные изменения белков



Сворачивание цепи

Сразу после синтеза полипептид должен принять правильную пространственную форму. Без этого даже длинная цепь аминокислот не станет полноценным и активным белком.



Химические модификации

Фосфорилирование и гликозилирование меняют свойства белка, его активность и способность взаимодействовать с другими молекулами. Такие изменения особенно важны для сигнальных и мембранных белков.



Дисульфидные мостики

Ковалентные связи между остатками цистеина укрепляют структуру белка и повышают его устойчивость. Они часто необходимы для работы секреторных и внеклеточных белков.



Помощь шаперонов

Шапероны направляют сворачивание и препятствуют неправильному слипанию молекул. Благодаря им клетка сохраняет качество белков и снижает риск образования неработоспособных агрегатов.

Ошибки биосинтеза белка и их последствия

- Таблица показывает, как разные нарушения на пути от гена к белку влияют на структуру и работу молекулы.
- Даже небольшая ошибка может изменить свойства белка, а затем повлиять на обмен веществ, развитие наследственных болезней и риск отдельных онкологических процессов.

Учебная молекулярная биология; обобщение типичных молекулярных нарушений

Ошибка	Последствие	Результат
Мутация	Замена аминокислоты	Изменённый белок
Сдвиг рамки	Неверное чтение кодонов	Нарушенная структура
Ошибка сплайсинга	Неправильные экзоны	Дефектная мРНК
Дефект тРНК-синтетазы	Неверная аминокислота	Снижение точности

Регуляция синтеза белка в клетке

01.

Уровень транскрипции

Клетка может усиливать или подавлять считывание конкретного гена. Так она управляет тем, какие белки будут вообще синтезироваться в данный момент.

02.

Созревание РНК

Сплайсинг, экспонирование и полиаденилирование определяют, станет ли первичный транскрипт полноценной мРНК. Это позволяет тонко менять состав белков из одного гена.

03.

Выход из ядра

Даже зрелая мРНК не начнёт работать, пока не покинет ядро. Контроль транспорта помогает клетке не тратить ресурсы раньше времени.

04.

Стабильность мРНК


Одни молекулы РНК быстро разрушаются, другие сохраняются дольше. Чем выше стабильность мРНК, тем больше белка успевает синтезироваться.

05.

Регуляция трансляции

На этапе работы рибосом клетка учитывает наличие аминокислот, энергии и сигнальных молекул. Это позволяет быстро отвечать на стресс, рост и изменение условий среды.

Факторы, влияющие на скорость синтеза белка




Скорость зависит не только от одного параметра: клетка работает эффективно лишь при согласованном сочетании всех условий и достаточном запасе ресурсов.

Наибольшее значение имеют питание, число рибосом и физиологические условия среды; отклонения быстро снижают эффективность трансляции.

Учебная биология: качественная схема зависимости скорости синтеза от условий среды

Практическое значение биосинтеза белков для медицины и биотехнологии



Антибиотики против бактериальных рибосом

Некоторые антибиотики избирательно нарушают работу рибосом бактерий, поэтому микроорганизмы не могут синтезировать жизненно важные белки. Такой механизм лежит в основе борьбы с инфекциями и показывает, насколько уязвим аппарат трансляции. Избирательность особенно важна для безопасности человека.



Рекомбинантные белки для лечения

В клетках-продуцентах получают инсулин, интерфероны, ферменты и другие препараты, которые затем используют в медицине. Здесь важны точность чтения гена и правильное сворачивание белка, иначе лекарство потеряет активность или станет небезопасным.




Генная инженерия и контроль качества

При создании модифицированных организмов и новых биотехнологических систем исследователи учитывают, как именно будет проходить синтез белка. От этого зависят урожайность клеточных культур, чистота продукта и возможность применять результат в промышленности и фармацевтике.

От гена к признаку: последовательность событий

Схема отражает путь реализации наследственной информации от ДНК до проявления клеточного признака.



Биосинтез белков — язык клетки, понятный через генетику



От ДНК до готового белка клетка проходит точную цепочку этапов, и каждый из них влияет на признак, который мы наблюдаем. Понимание этого пути помогает объяснять наследственность, болезни и возможности биотехнологии.