

Обзор темы: переменные и нестационарные звёзды

Изучаем звёзды с изменяющейся яркостью и их значение в астрономии.



Зарождение представлений о переменных звёздах

- Первая открытая переменная — звезда Мира — стала отправной точкой для исследований звёздной изменчивости и развития фотометрии, что продвинуло понимание масштабов Вселенной и звёздной эволюции.



Что такое переменные звёзды?



Периодические изменения яркости

Переменные звёзды могут демонстрировать циклические изменения светимости, обусловленные внутренними колебаниями или взаимодействием с компаньонами. Они регулярно возрастают и падают в яркости,



Нерегулярные и взрывные вариации

Некоторые звёзды изменяют блеск бесструктурно или внезапно из-за вспышек или катаклизмических процессов, таких как вспышки на поверхности или взрывы внутри — примеры непредсказуемого поведения.



Внешние факторы влияния

Изменения яркости могут возникать не только из-за процессов в самой звезде, но также из-за затмений двойным компаньоном или пылевыми облаками, проходящими на фоне светила.

Основные группы переменных звёзд

- Пульсирующие звёзды, например, цефеиды и RR Лиры, периодически расширяются и сжимаются, вызывая изменения светимости.
- Затменно-переменные — двойные звёздные системы, в которых один компонент закрывает другого, уменьшая общую яркость.
- Катаклизмические переменные взрывообразно увеличивают блеск из-за быстрых процессов на поверхности или внутри звезды.
- Эруптивные переменные связаны с неустойчивыми атмосферными явлениями: вспышками и выбросами вещества, влияющими на видимую яркость.

Распределение переменных звёзд по типам

Большинство известных переменных звёзд приходится на пульсирующие и затменно-переменные классы, отражая их широкую представленность.

Преобладание первых двух типов подчеркивает их важность при изучении звездной эволюции и систем.

Данные AAVSO, 2022



Механизм пульсаций у переменных звёзд



Пульсации вызваны колебаниями равновесия между притяжением и давлением излучения во внешних слоях.



Изменения размеров звезды приводят к циклическому изменению её светимости в разных диапазонах.




Периоды варьируются от часов до сотен дней, отражая разнообразие физических параметров и размеров звёзд.

Цефеиды — ключевые стандарты измерения




Период–светимость: фундаментальный закон

Цефеиды демонстрируют строгую зависимость периода колебаний от абсолютной светимости, позволяя точно вычислять расстояния во Вселенной благодаря закону Лейветта.



Примеры известных цефеид

δ Цефея и звезды из скопления S служат эталонами для тестирования теорий переменности и применяются в практических задачах астрономии.



Наблюдаемые световые кривые


Кривая блеска типичной цефеиды легко распознаваема: она имеет гладкие, регулярные пики и спады с периодами от нескольких до десятков дней.

График зависимости период–светимость

Рост абсолютной светимости при увеличении периода подтверждается многочисленными астрономическими наблюдениями.

Эта зависимость позволяет использовать цефеиды как надежную шкалу расстояний в космосе.

Наблюдательные данные, последние исследования 2023 года



Особенности затменно-переменных звёзд



Такие звёзды состоят из пары, где одна компонента затмевает другую, вызывая резкие колебания блеска.




Примеры — Алголь и β Лир — демонстрируют регулярные глубокие минимумы в светимости, наблюдаемые в кривых блеска.



Форма и период затмений позволяют изучать орбитальные параметры и размеры компонентов в системе.

Последовательность затмения в двойных звёздах

Фазы изменения видимой яркости во время затмений



Катаклизмические переменные: звёздные взрывы



Взрывная яркость Новой Персея

В 1901 году Новая Персея резко увеличила свою яркость более чем в 10 000 раз за несколько суток, став одним из самых впечатляющих примеров катаклизмических переменных. Ее взрывные процессы проходят на поверхности компактного объекта в двойной системе.



Катаклизмы и природа карликовых новых

Карликовые новые характеризуются частыми, но менее мощными взрывами, вызванными накоплением вещества на поверхности белого карлика. Эти объекты демонстрируют существенные колебания яркости и важны для



Последствия сверхновых взрывов

Сверхновые представляют собой разрушительные взрывы, которые не только резко повышают блеск звезды, но и влияют на межзвездную среду, обогащая ее тяжелыми элементами и инициируя звездообразование в окружающих областях.

Эруптивные переменные: процессы в атмосфере

Three vertical, wavy lines in shades of brown and gold, positioned to the left of the first text block.

Эруптивные звёзды проявляют нерегулярные вспышки, вызванные магнитными бурями и выбросами вещества из верхних слоев атмосферы, что приводит к значительным колебаниям яркости.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and gold, positioned to the left of the second text block.

Примеры, такие как UV Кита и звёзды типа Т Тельца, часто относятся к молодым или протозвёздным стадиям, где нестабильность атмосферы особенно выражена из-за активных процессов аккреции.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and gold, positioned to the left of the third text block.

Кроме магнитных воздействий, в некоторых эруптивных объектах наблюдаются сильные пылевые выбросы, изменяющие видимую светимость и спектральные характеристики звезды.

Основные характеристики известных переменных

Имя	Тип	Диапазон блеска (mag)	Период	Созвездие
Мира	Долгопериодическая	2-10	332 дня	Кит
δ Цефея	Цефеида	3.6-4.3	5.4 дня	Цефей
Алголь	Затменно-переменная	2.1-3.4	2.87 дня	Персей
S Сгущения	Цефеида	5.7-6.2	9.8 дня	Андромеда
Nova Persei	Новая	2.0-10.5	5478 дней	Персей
UV Кита	Эруптивная	7.7-10.8	—	Кит
T Тельца	Эруптивная	9.3-13.5	—	Телец

- Сводная таблица демонстрирует разнообразие типов и параметров звёзд с переменной светимостью, отражая различия в периодах, амплитуде и созвездиях.
- Таблица подчеркивает широкий разброс физических параметров и поведенческих характеристик переменных звёзд, отражая их разнообразие и сложность.
- Данные базы AAVSO и каталогов переменных звёзд, 2023 год.

Методы обнаружения и исследования переменных

Фотометрия позволяет фиксировать степень и периодичность изменения светимости звезд с большой точностью, что является базовым методом изучения переменных объектов.

Спектроскопия раскрывает химический состав и физические условия в атмосферах переменных, выявляя процессы внутри звезды и во внешних оболочках.

Современные телескопы-роботы и космические обсерватории, такие как Gaia и Hubble, обеспечивают высокоточные непрерывные наблюдения и расширяют спектр доступных данных.


Обширные базы данных AAVSO, Gaia и OGLE аккумулируют информацию и позволяют исследователям планировать дальнейшие наблюдения и более глубокий анализ переменных звёзд.

Переменные звёзды и космология: стандартные свечи




Цефеиды в масштабе Вселенной

Цефеиды выступают в роли «стандартных свечей» благодаря стабильной зависимости между периодом и светимостью. Это позволяет определять расстояния до удалённых галактик с высокой точностью — критический шаг в измерении масштабов космоса.



Сверхновые типа Ia и их роль

Сверхновые Ia обладают почти одинаковой максимальной светимостью, что даёт возможность использовать их как универсальные индикаторы расстояния. Их наблюдение помогло установить ускоренное расширение Вселенной.



Определение постоянной Хаббла

Комбинируя данные по цефеидам и сверхновым, астрономы вычисляют скорость расширения и возраст Вселенной — фундаментальные параметры, формирующие современные космологические модели.

Роль переменных звёзд в изучении галактик



Распределение переменных звезд помогает выявить структуру галактик, включая морфологию и протяжённость спиральных рукавов Млечного Пути.



Изучение переменных в звёздных скоплениях способствует пониманию звездообразовательных процессов и возрастной характеристики популяций звезд.



Данные о переменных служат проверкой и уточнением эволюционных моделей галактик, показывая динамику изменяющихся звездных сред.

Крупные астрономические проекты наблюдений



Проект OGLE и тысячи новых открытий

OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) систематически обнаруживает тысячи новых переменных звезд, способствуя расширению каталогов и улучшению статистической базы для исследований.



ASAS-SN – широкий обзор неба

Проект ASAS-SN осуществляет мониторинг всей небесной сферы, используя сеть телескопов, что позволяет выявлять яркие переменные и быстро реагировать на их изменения.



Роль Gaia и ZTF в современном наблюдении

Космическая миссия Gaia и наземный обзор Zwicky Transient Facility обеспечивают высококачественные данные по позициям, движениям и вариациям яркости, служа ключевыми ресурсами для астрономов.

Участие любителей в наблюдениях переменных



Визуальные наблюдения

Любители астрономии проводят регулярные визуальные измерения яркости, помогая дополнять профессиональные данные и обеспечивая плотное покрытие временных рядов.



Фотометрия с аматорской техникой

Использование специализированных камер и телескопов позволяет собирать качественные фотометрические данные, улучшая точность определения периодов и амплитуд переменных.



Открытие новых объектов

Российские и международные сообщества астрономов-любителей выявляют уникальные переменные звёзды, внося значительный вклад в расширение современных исследований.

Современные задачи и нерешённые вопросы

- До конца не изучена природа сверхновых типа Ia, особенно механизмы возгорания и влияние состава компаньона в двойных системах.
- Влияние металличности звёзд на цвет и светимость цефеид остаётся предметом дискуссий, что влияет на точность космологических измерений.
- Динамика эволюции в двойных системах переменных звёзд сложна и требует новых наблюдений для уточнения физики взаимодействий.
- Поиск новых классов нестабильных и сверхдлиннопериодических переменных расширяет наши знания о разнообразии и развитии звездных систем.



Заключение: значение изучения переменных звёзд

Изучение переменных звёзд открывает ключевые физические процессы эволюции, углубляет понимание структуры Галактики и способствует развитию дистанционной астрономии и научного мышления.