

Ключевые темы: молекулярная природа гена, строение и функции ДНК, процессы передачи информации в клетке

Обзор основных понятий молекулярной генетики и механизмов информационного обмена в клетке.



История открытия гена и структуры ДНК

От Менделя до Уотсона и Крика: ключевые эксперименты раскрыли природу наследственности и молекулярное строение ДНК, что дало старт современной генетике.



Современное определение гена

Ген — участок ДНК, кодирующий конкретный белок или функциональную РНК, обеспечивая различные биологические функции.

Состоит из регуляторных элементов (промоторы, энхансеры) и структурных частей: экзонов и интронов.

Существуют некодирующие гены, транскрибируемые в молекулы тРНК и рРНК, участвующие в синтезе белка.

Молекулярное строение ДНК: двойная спираль



Двойная спираль – основа стабильности

ДНК состоит из двух антипараллельных цепей, которые образуют спираль. Водородные связи между азотистыми основаниями обеспечивают устойчивость этой структуры.



Основные компоненты нуклеотида

Каждый нуклеотид содержит сахар дезоксирибозу, фосфатную группу и одно из четырёх оснований: аденин, тимин, гуанин или цитозин.




Антипараллельное расположение цепей

Цепи ДНК направлены в противоположные стороны, что критично для процессов репликации и транскрипции.

Визуализация структуры ДНК: модель и эксперимент

Рентгеноструктурные данные Франклин подтвердили параметры спирали, предложенной Уотсоном и Криком.

Модель двойной спирали точно отражает физическую структуру молекулы ДНК.



Данные Розалинд Франклин, 1952; публикация Уотсона и Крика, 1953

Физиологические функции ДНК в клетке

ДНК хранит и передаёт наследственную информацию через последовательность нуклеотидов при клеточном делении.

Обеспечивает программирование синтеза белков, определяя структуру и функции клеток.

Регулирует активность генов, влияя на адаптацию и развитие организма.

Служит основой для процессов репликации, транскрипции, рекомбинации и репарации генетического материала.

Типы РНК и их молекулярные функции


иРНК транслирует генетическую информацию из ядра в цитоплазму для синтеза соответствующих белков.

тРНК служит адаптером, доставляя аминокислоты к рибосомам согласно кодам иРНК.

рРНК образует структурный и каталитический каркас рибосомы, участвующий в сборке полипептидной цепи.

Центральная догма молекулярной биологии

Основные этапы передачи генетической информации в клетке



Строительный блок ДНК: структура нуклеотида

Состав нуклеотида

Нуклеотид состоит из сахара дезоксирибозы, фосфатной группы и одного из четырёх азотистых оснований. Эти компоненты формируют уникальную молекулярную структуру.

Типы азотистых оснований

Пуриновые основания (аденин, гуанин) обладают двухкольцевой структурой, тогда как пиримидиновые (цитозин, тимин) — одноцикловой, что влияет на схемы спаривания.



Типы химических связей в молекуле ДНК

Водородные связи между азотистыми основаниями образуют пары А–Т с двумя связями и G–C с тремя, дополнительно стабилизируя двойную спираль.

Участки с повышенным содержанием пар G–C обладают повышенной термостабильностью, что важно для устойчивости ДНК в различных условиях.

Внутри каждой цепи нуклеотиды связаны прочными ковалентными фосфодиэфирными связями, формируя цепь полинуклеотидов.

Сравнение ДНК и РНК: химические и функциональные отличия

Таблица сравнивает ключевые химические компоненты, структуру, локализацию и основные функции ДНК и РНК, отражая их различия и особенности в клеточных процессах.

ДНК и РНК отличаются химической структурой и местом функционирования, что обуславливает их разные биологические роли в клетке.

Параметр	ДНК	РНК
Сахар	Дезоксирибоза	Рибоза
Азотистые основания	Аденин, Тимин, Гуанин, Цитозин	Аденин, Урацил, Гуанин, Цитозин
Структура	Двойная спираль	Одиночная цепь
Локализация	Ядро, митохондрии, хлоропласты	Цитоплазма, ядро
Основные функции	Хранение и передача наследственной информации	Трансляция и регуляция генов

Репликация ДНК: сущность процесса

Репликация ДНК — точное копирование молекулы для образования двух идентичных дочерних молекул, обеспечивающее сохранение генетической информации при делении клеток.

Начинается в определённых участках — точках происхождения репликации, где спираль ДНК расплетается и формируется репликационная вилка.


Ключевые ферменты: хеликаза разрывает водородные связи для разделения цепей, ДНК-полимераза синтезирует новую цепь, следуя матрице родительской.

Примаза создаёт короткие РНК-праймеры, необходимые для начала синтеза, обеспечивая старт репликации на обеих цепях ДНК.

Этапы репликации ДНК: графическое представление

Каждая стадия репликации сопровождается четкими молекулярными изменениями, обеспечивающими точность и полноту копирования ДНК.


Понимание этапов репликации помогает раскрыть механизмы поддержания генетической стабильности при клеточном делении.



Ферменты репликации: ключевые роли и примеры


ДНК-полимераза — главный архитектор удлинения цепи

Этот фермент прикрепляет нуклеотиды к растущей цепи ДНК, используя исходную цепь как шаблон. Он обеспечивает высокую точность и скорость синтеза новой молекулы.




Хеликаза раскрывает двойную спираль

Удаляя водородные связи между нитями, хеликаза расплетает структуру ДНК, создавая пространство для ферментов, синтезирующих новые цепи.



Лигаза соединяет мосты в молекуле

Лигаза скрепляет короткие фрагменты Окадзаки на отстающей цепи, обеспечивая непрерывность ДНК. Репарационные ферменты исправляют ошибки для предотвращения мутаций.



Матричный принцип синтеза нуклеиновых кислот

Нуклеиновая кислота синтезируется строго по матрице исходной цепи, что гарантирует точную передачу генетической информации согласно принципу комплементарности.

Чаргафф установил равенство между аденином и тиминном, гуанином и цитозином, что подтверждает закономерность в структуре ДНК и её стабильность.

Этот принцип лежит в основе процессов репликации и транскрипции, обеспечивая консервативность наследственной информации сквозь поколения.

Транскрипция: определение и функциональное значение

Транскрипция заключается в копировании информации с ДНК на иРНК по принципу комплементарности, что необходимо для синтеза белков.

Эта процедура обеспечивает реализацию генетической программы в конкретных клетках, регулируя процесс образования белков.

Транскрипция способствует тканевой специфичности, позволяя клеткам выполнять разные функции в организме.

Область транскрипции интенсивно регулируется, что позволяет адаптировать экспрессию генов к изменениям в среде и развитию.

Стадии транскрипции: молекулярные механизмы



Инициация транскрипции

Начинается связыванием РНК-полимеразы с промотором гена. Затем участок ДНК локально расплетается, открывая матрицу для синтеза РНК.

Элонгация и терминация транскрипта

Фермент продвигается вдоль матричной цепи, удлиняя иРНК. Завершение происходит при достижении терминатора, после чего РНК отделяется от ДНК.

Сравнение транскрипции у прокариот и эукариот

Параметр	Прокариоты	Эукариоты
Локализация	Цитоплазма	Ядро
РНК-полимеразы	Одна	Несколько видов
Процессинг РНК	Отсутствует	Сплайсинг, кэпирование, полиаденилирование
Структура генов	Опероны	Раздельные гены

Таблица иллюстрирует основные различия в организации и механизмах транскрипции между прокариотическими и эукариотическими клетками.

Различия обусловлены уровнем организации клеток и обеспечивают более сложную регуляцию экспрессии генов у эукариот.

Биологическое значение транскрипции для организма

Транскрипция воплощает наследственные программы, формируя белки, необходимые для функционирования и развития клеток.

Регулируя скорость и точность транскрипции, клетки адаптируют свои функции к изменяющимся условиям окружающей среды.

Это обеспечивает разнообразие фенотипических проявлений и устойчивость к стрессовым воздействиям, поддерживая гомеостаз организма.

Роль гена, ДНК и транскрипции в жизни организмов

Генетический код хранится и передаётся через процессы репликации и транскрипции, что обеспечивает непрерывность жизни и потенциал для биотехнологического прогресса.