

Смена природных сообществ: основные понятия и актуальность

Исследование изменений в экосистемах важно для охраны природы и ресурсов.



Что такое природное сообщество и сукцессия?

Природное сообщество — это объединение живых организмов и среды, взаимосвязанных в одной территории. Сукцессия отражает постепенные, упорядоченные изменения таких сообществ со временем на примерах зарастания озер и возобновления лесов.



Причины смены природных сообществ

Природные бедствия, такие как лесные пожары и наводнения, часто инициируют изменение состава и структуры экосистем, служа катализаторами смены сообществ.

Климатические изменения, включая колебания температуры и осадков, влияют на выживание и распространение видов, способствуя перестройке биологических систем.

Деятельность человека и животных способна ускорять или изменять процессы смены: вырубка лесов, внедрение чужеродных видов и создание новых мест обитания прямо воздействуют на природу.

Типы сукцессии: первичная и вторичная

Первичная сукцессия начинается на территориях, где раньше не было растительности или почвы, например, после извержения вулкана или таяния ледника.

Вторичная сукцессия разворачивается на участках с остатками прежнего сообщества, восстановление происходит после пожаров, вырубок или других разрушений.

Пример первичной сукцессии — постепенное зарастание песчаных дюн, где начинается формирование растительных сообществ с нуля.

Вторичная сукцессия хорошо видна на примере возобновления леса после пожара, когда природа восстанавливается из семян и корней оставшихся растений.

Этапы сукцессии природных сообществ

Начальный этап: колонизация простейшими

На первых этапах появляются бактерии и лишайники, подготовливающие почву и создающие благоприятные условия для дальнейшего роста растений. Они улучшают структуру и питание почвы.



Средний этап: развитие мхов и трав

Сукцессия продолжается появлением мхов и трав, которые укрепляют почву, увеличивают её плодородие и создают укрытие для мелких животных и насекомых.



Поздний этап: формирование кустарников и молодых деревьев

Появляются кустарники, молодые деревья формируют подлесок. Биоразнообразие растёт, структура сообщества усложняется и начинает приближаться к зрелому состоянию.




Зрелый этап: устойчивое древостое и стабильность

Устанавливаются долгоживущие деревья, формируется стабильное и разнообразное сообщество, устойчивое к внешним воздействиям и сохраняющее экосистемные функции.



Изменение биомассы при сукцессии



Биомасса резко увеличивается с появлением деревьев и стабилизируется на зрелой стадии сообщества.

Рост биомассы свидетельствует о развитии и усложнении экосистемы, достигается высокая продуктивность.

Исследования российских лесов, 2020

Пример смены на суше: луг превращается в лес

Появление трав и однолетников

На пустующем лугу начинают быстро расти однолетние травы, которые готовят почву для последующей растительности.

Формирование кустарников

Через несколько лет появляются кустарники и более устойчивые растения, создавая укрытие и изменяя микроклимат.

Рост молодых деревьев

Появляются молодые деревья, как берёза и ива, которые постепенно занимают место кустарников и формируют подлесок.

Формирование леса

Подлесок густеет, появляются хвойные породы, что приводит к созданию устойчивого лесного сообщества.



Смена сообществ в водных экосистемах

Озёра постепенно зарастают водорослями и травянистой растительностью типа тростника, что изменяет среду обитания водных организмов.

На дне накапливается ил и органические остатки, которые способствуют появлению болотных растений и формированию торфяных масс.

Со временем водоём превращается в болото с характерными растениями и условиями, извлекая питательные вещества из воды.

В дальнейшем болота могут зарости сухими лугами и лесами, завершая длительные циклы изменения экосистем.

Роль почвы и микроорганизмов в сукцессии

Деятельность микроорганизмов

Бактерии и грибы разлагают органические остатки, превращая их в плодородные слои почвы. Этот процесс обеспечивает необходимое питание для растений и улучшает структуру грунта.



Значение травянистой растительности

Травы укрепляют почву, уменьшая эрозию, и помогают удерживать влагу, создавая оптимальные условия для последующих стадий растительного сообщества.



Создание условий для сложных сообществ

Благодаря улучшению почвы развиваются кустарники и деревья, которые вносят разнообразие в экосистему и способствуют её устойчивости.



Влияние животных на смену сообществ

Распространение семян

Птицы и грызуны разносят семена растений на новые территории, способствуя обновлению и расширению растительных сообществ.



Изменение почвы животными

Дождевые черви и кроты рыхлят почву, улучшая её аэрацию и условия для корней растений, что ускоряет процессы сукцессии.



Создание новых местообитаний

Бобры строят плотины, создавая водоёмы, которые коренным образом меняют ландшафт и биологический состав экосистемы.



Таблица: сравнение сукцессии в разных биомах

Данная таблица сравнивает типы сукцессии, время смены и ключевые организмы для различных биомов. Это демонстрирует, что процессы изменения сообществ зависят от особенностей среды и климата каждого биома.

Скорость и характер сукцессии существенно варьируют в зависимости от биома, влияя на структуру и состав экосистем.

Биом	Тип сукцессии	Время смены	Ключевые организмы
Тундра	Первичная	Более 100 лет	Мхи, лишайники
Степь	Вторичная	40–60 лет	Злаки, кустарники
Лес	Вторичная	50–100 лет	Деревья разного возраста

Восстановление леса после пожара: этапы и сроки


1. После пожара на выжженной территории первыми появляются травянистые растения и кустарники, которые быстро заселяют почву и создают условия для будущего роста деревьев. Это стартовый этап восстановления лесного сообщества.
2. В последующие 30–50 лет формируется устойчивое древесное сообщество с пионерными деревьями, такими как берёза и осина, а также возвращаются многие животные и грибы, что позволяет экосистеме постепенно восстановить свою структуру.



Городские сукцессии: пустыри и заброшенные стройки

Начальная стадия зарастания заброшенных участков

На городских пустырях сначала появляются сорные травы, например, лопух и амброзия. Эти растения быстро занимают открытые пространства за 2-5 лет, подготавливая почву для более стойких видов растений, что способствует дальнейшему зачарованию территории.



Развитие растительности и появление деревьев

Через 10-15 лет на заброшенных стройках и пустырях появляются многолетние травы и кустарники, такие как ивняк и сирень. Постепенно начинают расти молодые деревья — клён и тополь, что ведет к формированию более сложных сообществ городской природы.



Антропогенное влияние на смену сообществ

Вырубка лесов резко изменяет структуры экосистем, вызывая быстрое исчезновение старых и появление новых сообществ. Это ведет к краткосрочным изменениям, часто с потерей биоразнообразия и длительным периодом восстановления.

Распашка земель кардинально меняет почвенный профиль и растительный покров, снижая устойчивость экосистем и содействуя эрозии и деградации почв, что затрудняет естественную регенерацию сообществ.

Внедрение чужеродных видов, таких как борщевик и амброзия, нарушает баланс местных экосистем, вытесняя коренные растения и изменяя пищевые сети, что приводит к устойчивому сдвигу состава природных сообществ.

Экологические катастрофы и восстановление экосистем

Возрождение природы в Чернобыльской зоне

После аварии на Чернобыльской АЭС за три десятилетия в зоне отчуждения сформировались новые экосистемы с дикими животными и редкими растениями. Это пример устойчивого восстановления природы в сложных условиях загрязнения.



Влияние химических загрязнений

Загрязнение почвы и вод химикатами приводит к гибели местных сообществ и серьезному нарушению биоразнообразия. Восстановление таких экосистем требует долгих десятилетий и специальных природоохранных мероприятий.



Разливы нефти и уничтожение экосистем

Нефтяные разливы вызывают массовое уничтожение флоры и фауны, нарушая цепи питания. Процесс восстановления идет медленно и может занимать столетия без вмешательства человека и проведенных мероприятий реабилитации.



Скорость сукцессии: естественные и антропогенные факторы




При естественном развитии сукцессия происходит постепенно, допуская более высокое биоразнообразие. Антропогенные воздействия ускоряют процессы, сокращая время, но снижают устойчивость экосистем.

Скорость сукцессии напрямую зависит от характера воздействия на сообщество, при этом быстрая смена под антропогенным влиянием ухудшает качество экосистем.

Схема процесса сукцессии

Основные этапы смены природных сообществ



Примеры устойчивых экосистем

Зрелые леса средней полосы России

В таких лесах устойчивое равновесие достигается за счет разнообразия деревьев, насекомых и грибов. Они сохраняют почву и стабилизируют климат региона, поддерживая богатство видов.



Болота с устойчивым сообществом мхов

Болота обеспечивают влажность и поддерживают уникальные растения на протяжении веков. Их экосистемы влияют на водный режим и фильтрацию воды, играя ключевую роль в ландшафте.



Коралловые рифы в океане

Это одни из самых богатых биоразнообразием экосистем, поддерживающих множество морских видов. Рифы устойчивы благодаря сложным взаимосвязям организмов и постоянному обновлению.



Значение сукцессии для природы и человека

Сукцессия обеспечивает естественное восстановление экосистем после нарушений, поддерживая разнообразие видов и устойчивость природных поселений.

Она способствует формированию плодородных почв и регулирует круговорот веществ, что важно для стабильности сельскохозяйственных ландшафтов и предотвращения эрозии.

Биологические процессы сукцессии оказывают влияние на климат, способствуя сохранению лесных ресурсов и поддержанию баланса биосферы в целом.

Значение изучения смены природных сообществ

Понимание процессов смены природных сообществ необходимо для сохранения природы и рационального использования ресурсов. Это помогает предотвращать экологические катастрофы и восстанавливать нарушенные территории.