

Как реализуется генетическая информация

От ДНК к белку — путь, по которому
записанные в генах инструкции
становятся признаками.



От гена к признаку: почему это важно

Ген хранит инструкцию для синтеза продукта, чаще всего белка. Но хранение информации ещё не означает её немедленное использование: у эукариот ДНК и белковый синтез разделены по разным частям клетки, а работа генов зависит от типа клетки и условий среды.



Строение гена как исходной записи

Промотор и границы гена

01

Промотор задаёт участок начала считывания: сюда присоединяется РНК-полимераза. Терминатор, напротив, обозначает завершение транскрипции и помогает точно ограничить участок ДНК, который будет переписан в РНК.

Кодирующая часть

02

Внутри гена находится последовательность нуклеотидов, несущая основную информацию о будущем продукте. Именно она определяет порядок кодонов, а значит, и последовательность аминокислот в синтезируемом белке.

Экзоны и интроны

03

У эукариот кодирующие участки, экзоны, сохраняются в зрелой мРНК, тогда как интроны удаляются при обработке. Такое строение делает реализацию информации более гибкой и точной.

3

Связь с белком


04

Информация в ДНК читается не по отдельным буквам, а по триплетам. Каждый триплет соответствует определённой аминокислоте, поэтому последовательность нуклеотидов непосредственно задаёт структуру белковой молекулы.



Путь реализации генетической информации

Последовательность этапов от хранения информации в ДНК до получения функционального белка.



Транскрипция: синтез РНК на матрице ДНК

Матрица и фермент

РНК-полимераза распознаёт нужный участок ДНК и использует одну из цепей как матрицу. Она собирает РНК, подбирая нуклеотиды по принципу комплементарности, поэтому последовательность нового полимера отражает информацию исходного гена.

Направление синтеза

Синтез РНК идёт только в направлении $5' \rightarrow 3'$. Это означает, что фермент наращивает цепь с одного конца, а матричную цепь ДНК считывает в противоположном направлении — $3' \rightarrow 5'$.



Старт и завершение

Транскрипция начинается на промоторе, где фермент занимает правильное положение и запускает считывание. Завершается процесс на терминаторе, который служит сигналом остановки и отделения готовой РНК.

Особенности РНК

В составе РНК вместо тимина присутствует урацил, поэтому пары оснований строятся немного иначе, чем в ДНК. Это отличает РНК как рабочую копию генной информации, используемую в дальнейших этапах.

Сравнение ДНК, РНК и белка

Сопоставление показывает, как наследственная информация проходит путь от хранения к реализации и превращается в функциональный продукт.

ДНК хранит информацию, РНК переносит и перерабатывает её, а белок выполняет клеточную работу. Реализация наследственных сведений завершается образованием функциональной молекулы.

Признак	ДНК	РНК	Белок
Мономеры	нуклеотиды	нуклеотиды	аминокислоты
Сахар	дезоксирибоза	рибоза	—
Основания	Т, А, Г, Ц	А, У, Г, Ц	—

Обработка РНК у эукариот

Сначала синтезируется пре-мРНК, в которой ещё присутствуют и кодирующие, и некодирующие участки. Это исходная копия гена, с которой клетка затем проводит точную «настройку».

1. Образование
первичного транскрипта

2. Кэпирование 5'-
конца

К 5'-концу присоединяется кэп-структура. Она защищает молекулу от быстрого разрушения и помогает рибосоме распознать мРНК на следующем этапе.

Интроны вырезаются, а экзоны соединяются в единую последовательность. Благодаря этому из одной и той же исходной записи получается зрелая информационная молекула, пригодная для перевода.

3. Сплайсинг

4.
Полиаденилирование

К 3'-концу добавляется поли-А-хвост. Он повышает стабильность мРНК, облегчает её экспорт из ядра и делает молекулу более удобной для работы в цитоплазме.

Созревание мРНК и выход в цитоплазму

Последовательность этапов обработки и переноса информационной РНК у эукариот.



Трансляция: чтение мРНК рибосомой

1

Рибосома и кодоны

Рибосома движется вдоль мРНК и читает её последовательность по три нуклеотида. Такой триплет называется кодоном, а его смысл определяется генетическим кодом.

2

Роль тРНК

Каждую аминокислоту приносит тРНК, у которой есть антикодон, комплементарный кодону мРНК. Это обеспечивает точность сборки полипептидной цепи и соответствие текста РНК будущему белку.

3

Старт и стоп

Чаще всего началом служит кодон AUG, задающий старт синтеза. Завершение происходит на стоп-кодонах UAA, UAG или UGA, после чего рибосома освобождает готовую цепь.

4

Первичная структура


Порядок кодонов определяет последовательность аминокислот в белке. Именно эта первичная структура задаёт последующее сворачивание молекулы и её биологические свойства.



Кодонный принцип и свойства генетического кода

Триплетность кода позволяет записывать информацию компактно, а вырожденность снижает риск ошибок при считывании.

Из 64 кодонов только 3 не задают аминокислоты. Это показывает, что генетический код одновременно экономен, устойчив и практически универсален.



Этапы трансляции

01

Инициация

Малая субъединица рибосомы узнаёт стартовый кодон мРНК, после чего присоединяется тРНК с метионином и формируется рабочий рибосомный комплекс.

02

Элонгация

Рибосома последовательно считывает кодоны, а тРНК доставляют аминокислоты, которые соединяются пептидными связями в растущую полипептидную цепь.

03

Терминация

При достижении стоп-кодона синтез останавливается, полипептид освобождается, а рибосомные субъединицы расходятся и могут участвовать в новом цикле.

После синтеза: сворачивание и модификации белка

Формирование структуры

01

Сразу после трансляции цепь начинает сворачиваться, образуя вторичную и третичную структуру. От правильной укладки зависит, сможет ли белок выполнять свою функцию в клетке.

Помощь шаперонов

02

Шапероны связываются с незрелыми белками и предотвращают неправильные контакты между участками цепи. Это снижает риск агрегации и помогает белку принять устойчивую форму.

Химическая доработка

03

После синтеза возможны фосфорилирование, гликозилирование и протеолитическое расщепление. Такие изменения могут включать или выключать активность белка, менять его стабильность и адрес доставки.

04

Итоговое созревание


Некоторые белки объединяются в комплексы из нескольких субъединиц, то есть приобретают четвертичную структуру. Только после этого они становятся полностью функциональными и готовыми к работе.



Уровни регуляции экспрессии гена

Регуляция особенно заметна в самом начале пути: доступность ДНК часто определяет, будет ли ген вообще использован.

Чем раньше включается контроль, тем сильнее он влияет на конечное количество белка и экономит ресурсы клетки.



Почему одни гены активны, а другие молчат



Специализация клетки

В ходе развития клетки получают разные функции, поэтому в них включаются разные наборы генов. Нейронам нужны одни белки, а клеткам печени — совсем другие.



Эпигенетическое «закрытие»

Метилирование ДНК и изменения хроматина могут сделать участок гена менее доступным для считывания. Такой механизм помогает надолго сохранять выбранную программу работы клетки.



Ответ на сигналы

Гормоны, факторы роста и условия среды могут временно усиливать или подавлять экспрессию генов. Благодаря этому клетка быстро перестраивает синтез белков под текущие задачи.



Реализация генетической информации у прокариот и эукариот


Признак	Прокариоты	Эукариоты
Ядро	нет	есть
Транскрипция	цитоплазма	ядро
Обработка РНК	минимальна	сплайсинг, кэп, поли-А

Сравнение показывает, как организация клетки влияет на скорость и точность реализации генетической информации.

У прокариот процессы идут быстрее и проще, а у эукариот — отдельно и точнее регулируются благодаря ядру и обработке РНК.

От ДНК к признаку организма

Схема отражает общий путь реализации наследственной информации в клетке и её превращение в наблюдаемый признак.



Ошибки и мутации в реализации информации

Изменение последовательности

Мутации могут заменять, выпадать или вставлять нуклеотиды в гене. Даже небольшое изменение иногда меняет смысл кодона и приводит к синтезу белка с иными свойствами.

Нарушение обработки РНК

Если мутация затрагивает участки сплайсинга, интроны могут удаляться неправильно. В результате зрелая мРНК становится дефектной, а белок — укороченным или изменённым.

Преждевременная остановка

Некоторые мутации превращают обычный кодон в стоп-сигнал. Тогда синтез прекращается раньше времени, и клетка получает неполный, часто нефункциональный белок.


Системы исправления

Репарация ДНК и контроль качества РНК снижают число ошибок на разных этапах. Благодаря им клетка сохраняет точность передачи информации и уменьшает риск серьёзных нарушений.

Влияние среды на экспрессию генов

Сигналы среды не меняют саму последовательность ДНК, но могут заметно перестраивать активность генов и набор синтезируемых белков.

Наиболее сильный эффект дают гормональные сигналы и состояние питания, а стресс и внешние условия часто запускают защитные программы клетки.



Практическое значение изучения экспрессии генов

Медицина и диагностика

Анализ активности генов помогает выявлять наследственные нарушения, оценивать риск болезней и подбирать лечение. Врачи используют эти данные для более точной диагностики и наблюдения за пациентом.

Производство белков

С помощью бактерий и клеток млекопитающих получают инсулин, ферменты, факторы свертывания и другие полезные белки. Такие биотехнологические системы работают как управляемые клеточные «фабрики».

Вакцины и препараты

Понимание экспрессии генов помогает создавать современные вакцины и лекарства, включая рекомбинантные белки. Это ускоряет разработку препаратов и повышает их чистоту и предсказуемость.

Персонализированный подход

Изучение работы генов лежит в основе персонализированной медицины, где учитывают особенности конкретного человека. Такой подход повышает точность терапии и снижает риск побочных эффектов.

Генетическая информация: от записи к признаку

Клетка превращает запись в ДНК в работающий белок через строго согласованные этапы. Именно поэтому наследственность, развитие и приспособление организмов можно понять как единый, хорошо регулируемый процесс.

