

Цитоплазма и рибосомы: основы клеточного строения и функционирова ния

Цитоплазма и рибосомы —
фундаментальные компоненты жизни
клетки и синтеза белка.




История открытия цитоплазмы и рибосом

Термин «цитоплазма» предложил Р. Браун в 1831 году, далее её структуру детально изучил Ж. Портер. Рибосомы открыты А. Клодом в 1955 году с помощью электронного микроскопа, что стало прорывом в клеточной биологии и молекулярных исследованиях.



Строение и состав цитоплазмы




Гиалоплазма — жидкая основа цитоплазмы

Гиалоплазма состоит примерно на 70-80% из воды с растворёнными ионами и органическими веществами. Она создаёт среду для органоидов и регулирует обмен веществ.



Органоиды внутри цитоплазмы

Митохондрии, эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи обеспечивают энергию, синтез и транспорт белков, играя ключевую роль в жизни клетки.



Включения и буферные системы

В цитоплазме находятся запасные вещества — капли жира, гликоген и кристаллы. Буферные системы поддерживают оптимальный pH для биохимических реакций.

Функции цитоплазмы: интеграция процессов и обмен веществ


Цитоплазма обеспечивает транспорт молекул и создает среду для обмена веществ, включая гликолиз и синтез белков.

Она поддерживает форму клетки и правильное расположение органелл, обеспечивая их эффективное функционирование.

Аккумулирует питательные вещества и распределяет энергетические ресурсы для нужд клетки.


Участвует в адаптации клеток к внешним стрессам, регулируя биохимические и транспортные механизмы.

Цитоскелет: архитектура цитоплазмы




Микротрубочки — каркас клетки

Микротрубочки диаметром 23 нм формируют структурный скелет, отвечая за механическую прочность и внутриклеточный транспорт везикул.



Промежуточные филаменты

Обладая диаметром 8-12 нм, они придают клетке устойчивость и связывают органоиды, участвуют в делении и поддержании структуры.



Актиновые филаменты

Эти тонкие нити (6-7 нм) обеспечивают подвижность клетки, формируют цитоплазматические потоки и участвуют в образовании жгутиков и ресничек.

Гиалоплазма: структурная и биохимическая основа цитоплазмы

Гиалоплазма представляет собой вязкую коллоидную жидкость, богатую растворёнными низкомолекулярными соединениями и ионами.

Она содержит ферменты, участвующие в гликолизе, и служит площадкой для свободной диффузии молекул внутри клетки.

Гиалоплазма играет важную роль в сборке и разборке элементов цитоскелета и выступает метаболическим буфером.


Сравнение цитоплазмы животных и растительных клеток

Основные различия цитоплазмы связаны с осмотической регуляцией, органеллярной структурой и функциями, обусловленными типом клетки.

Различия отражают адаптацию к специфическим функциям и средам обитания различных типов клеток.


Параметр	Животная клетка	Растительная клетка
Процент воды	70%	80-90%
Вакуоли	Отсутствуют	Крупные, присутствуют
Органеллы	Много митохондрий	Пластиды преобладают
Цитоскелет	Отличается состав и функции	Отличается состав и функции

Рибосомы: строение, состав и типы



Общие особенности рибосом

Рибосомы состоят из двух субъединиц, включающих рибосомную РНК и множество белков, обеспечивающих функциональность комплекса.



Типы рибосом у прокариот и эукариот

Прокариоты имеют 70S рибосомы (50S + 30S), эукариоты — 80S (60S + 40S), различия отражают комплексность клеток.



Локализация рибосом

Рибосомы могут свободно плавать в цитоплазме или быть связаны с мембранами эндоплазматического ретикулума для синтеза различных белков.

Строение рибосом: субъединицы и молекулярная организация

Эукариотические рибосомы состоят из малой субъединицы 40S с 18S рРНК и большой 60S с несколькими рРНК и около 49 белками.

Прокариотические рибосомы включают малую 30S субъединицу с 16S рРНК и большую 50S с рРНК 23S и 5S и примерно 34 белками.

Сборка рибосомы происходит при инициации синтеза белка, объединяя две субъединицы вокруг мРНК.


Рибосомы обладают тремя функциональными сайтами для связывания тРНК: Р, А и Е, что обеспечивает эффективный синтез белка.

Сравнительная характеристика рибосом эукариот и прокариот


Прокариотические рибосомы синтезируют полипептиды быстрее, несмотря на меньшую массу и количество белков.

Структурные различия рибосом влияют на фармакологическую избирательность антибиотиков и скорость белкового синтеза.

Данные биохимических исследований рибосом, 2023




Локализация и функции рибосом в клетке



Свободные рибосомы и синтез цитозольных белков

Свободные рибосомы находятся в цитоплазматической гиалоплазме и синтезируют белки, которые остаются внутри клетки — в цитозоле, митохондриях и пероксисомах. Их активность тесно связана с метаболическими потребностями клетки.



Рибосомы на шероховатой ЭПР: производство мембранных белков

Рибосомы, прикреплённые к шероховатой эндоплазматической сети, отвечают за синтез белков, предназначенных для мембран, лизосом и секреции. Плотность рибосом в этом месте отражает интенсивность белкового синтеза.

Биохимический процесс синтеза белка на рибосомах

Трансляция начинается с инициации — связывания малой субъединицы рибосомы с мРНК и инициационной тРНК, распознающей старт-кодон AUG.


Элонгация — последовательное присоединение аминокислот к полипептидной цепи с помощью тРНК и энергетически затратных реакций, обеспечиваемых GTP.

Терминация наступает при достижении стоп-кодона, что приводит к освобождению сформированного полипептида и диссоциации комплекса.

Матричная иРНК определяет точный порядок аминокислот, обеспечивая адаптацию белка к функциям клетки и её потребностям.

Сборка рибосомы на мРНК и этапы трансляции

Последовательность этапов формирования комплексов и процесса синтеза белка




Полисомы: фабрики белкового синтеза

Полисомы представляют собой комплексы нескольких рибосом, одновременно движущихся по одной молекуле мРНК, позволяя интенсивно синтезировать белок.

Высокая концентрация полисом отмечается в клетках с активной белоксинтетической деятельностью, таких как мышечные, нервные и железистые клетки.


Связь полисом с цитоскелетом способствует координированному распределению и транспортировке новосинтезированных белков.

Взаимосвязь цитоплазмы и рибосом: системный подход



Роль цитоплазмы в обеспечении рибосом ресурсами

Цитоплазма снабжает рибосомы необходимыми аминокислотами, ионами, АТФ и ферментами для эффективного белкового синтеза. Без этих компонентов происходит замедление процессов трансляции.



Значение среды цитоплазмы для транспорта белков

Транспорт новосинтезированных белков и сигнальных молекул напрямую зависит от гомеостаза цитоплазмы — ионного баланса и оптимального pH, обеспечивающих их стабильность и правильное распределение.



Нарушения цитоплазматических условий и последствия для рибосом

Изменение состава ионов или сдвиги pH приводят к снижению активности рибосом и ослаблению метаболизма клетки, что негативно отражается на жизнеспособности и функции клеток.

Последствия нарушений в работе рибосом и цитоплазмы

- Мутации в рРНК или рибосомных белках вызывают наследственные заболевания, например, анемию Даймонда-Блекфана с проявлениями в кроветворении и развитии тканей.
- Синдром Швахмана-Даймонда сопровождается дефектами в работе рибосом и приводит к задержке роста и иммунным нарушениям у пациентов.
- Патологии цитоплазмы, такие как гликогенозы, влияют на обмен веществ и приводят к сбоям в клеточном метаболизме и энергетическом обеспечении.

Рибосомы как мишени антибиотиков: медицинские аспекты


Аминогликозиды, тетрациклины и макролиды избирательно блокируют бактериальные рибосомы, пресекая трансляцию и угнетая рост патогенов.

Структурные различия рибосом бактерий и эукариот обеспечивают эффективность антибиотиков и минимизируют токсичность для клеток человека.

Механизмы устойчивости включают мутации в рРНК, изменение проницаемости клеточных мембран и инактивацию антибиотиков ферментами.


Знание биохимии рибосом помогает разрабатывать новые лекарственные средства, способные преодолевать резистентность бактерий.

Рибосомы и цитоплазма в биотехнологии и генетической инженерии




Экспрессия человеческих белков на бактериальных рибосомах

Модифицированные рибосомы бактерий применяются для производства терапевтических белков, таких как инсулин и гормон роста, с помощью генно-инженерных методов.



Системы in vitro для изучения белкового синтеза

Лабораторные модели с искусственно собранными рибосомными комплексами позволяют исследовать механизмы трансляции и разрабатывать биосинтетические технологии.



Рибосомные РНК как перспективные биомаркеры

Циркулирующие в крови рибосомные РНК рассматриваются как потенциальные индикаторы онкологических и генетических заболеваний, расширяющие возможности диагностики.

Филогенетические аспекты: эволюция цитоплазмы и рибосом

Рибосомы считаются одними из древнейших клеточных структур и характеризуются консервативным строением среди всех живых организмов.

Общность механизмов трансляции между эукариотами и прокариотами указывает на их общее эволюционное происхождение и фундаментальную роль в жизни.

Усложнение цитоплазматической организации связано с возникновением специализированных органелл и функциональным разделением в клетках эукариот.

Цитоплазма и рибосомы: фундаментальные компоненты ЖИЗНИ КЛЕТКИ

Цитоплазма и рибосомы совместно обеспечивают жизнедеятельность клетки, формируя основу метаболизма и синтеза белков. Их изучение — ключ к пониманию биологических процессов и развитию медицинских технологий.

