

Общая характеристика типа Членистоногие: ключевые темы

Членистоногие — крупнейшая группа животных с членистым телом и хитиновым скелетом.



Происхождение и эволюция членистоногих

Появившись более 500 миллионов лет назад, членистоногие заняли почву, воду и воздух. Их разнообразие и роль в природе делают их важным объектом изучения биологии и экологии.



Видовое разнообразие членистоногих



Насекомые — лидеры по видам

Насекомые включают более миллиона видов, от жуков до бабочек и муравьёв. Их разнообразие позволяет им обитать почти везде, включая самые разные климатические зоны.



Паучьи и скорпионы

Паукообразные насчитывают около 100 тысяч видов, включая пауков и скорпионов. Они играют важную роль в контроле численности насекомых и других мелких животных.



Ракообразные — вода и берега

Ракообразные представлены примерно 70 тысячами видов, от маленьких рачков до крабов. Большинство из них живёт в морских и пресных водах.



Многоножки — почвенные обитатели

Многоножки и двупарноногие составляют около 14 тысяч видов. Они населяют почву, помогая разлагать органику и улучшать структуру грунта.

Строение тела: основные особенности

.01

Тело членистоногих разделено на отделы: голова, грудь и брюшко, иногда слияние отделов в головогрудь.

.02

Членистые конечности, число которых зависит от класса, обеспечивают движение и манипуляции.

.03

Хитиновый наружный покров служит защитой и опорой для мышц организма.

.04

Дополнительные структуры: крылья у насекомых, клещи у ракообразных, жвалы у паукообразных.

Функции внешнего скелета



Защита и опора

Хитиновый покров надёжно защищает тело членистоногих от повреждений и предотвращает потерю влаги. Он обеспечивает крепкую основу для крепления мышц и движения.



Рост через линьку

Рост невозможен без периодической смены старого покрова — линьки. Во время этого процесса животное временно становится мягким и уязвимым, что требует укрытия.

Основные классы членистоногих и их отличия

Сравнение ключевых признаков четырёх больших классов членистоногих.

Каждый класс обладает уникальными чертами, обеспечивающими успех в своей среде обитания.

Класс	Количество ног	Строение тела	Среда обитания
Насекомые	6	Голова, грудь, брюшко	Наземные, воздух
Паукообразные	8	Головогрудь и брюшко	Наземные, почва
Ракообразные	10+	Голова-грудь, брюшко	Водные
Многоножки	Много	Много сегментов	Почва

Биологические учебники и справочники

Среды обитания и адаптации членистоногих



Членистоногие освоили сушу, пресную и солёную воду, почву и воздух, демонстрируя удивительную экологическую пластичность.



Адаптации включают мимику, ядовитые железы и камуфляж, помогающие избегать врагов и охотиться.



Некоторые виды паразитируют на животных и человеке, используя специализированные навыки выживания.

Органы чувств членистоногих



Зрение

Сложные фасеточные глаза позволяют насекомым и ракообразным видеть мир в деталях, а простые глаза пауков помогают улавливать изменения света.



Осязание

Чувствительные усики и волоски используются для восприятия вибраций и прикосновений, обеспечивая навигацию и коммуникацию.



Обоняние и слух

Специальные органы, такие как жужжальца и тимпаны, помогают воспринимать запахи и звуки, что важно для поиска пищи и общения.

Дыхательная система у разных групп членистоногих

.01

Насекомые дышат через трахеи — сеть трубочек, доставляющих воздух непосредственно к клеткам организма.

● **.02**

Паукообразные используют книжные лёгкие, состоящие из тонких пластинок с большим числом капилляров для обмена газами.

● **.03**

Ракообразные дышат жабрами, которые эффективно извлекают кислород из воды для их водного образа жизни.

Особенности кровеносной системы членистоногих

.01

Кровеносная система незамкнутая: гемолимфа циркулирует в полости тела, омывая органы напрямую.

.02

Сердце трубчатое, проталкивает гемолимфу через сосуды и полости тела, обеспечивая транспорт веществ.

.03

У ракообразных гемолимфа содержит дыхательный пигмент гемоцианин на основе меди, придающий голубой цвет крови.

.04

У насекомых и паукообразных гемолимфа обычно бесцветная или желтоватая, что отражает различия в составе и функциям.

Сравнение численности основных групп членистоногих



Данные по численности членистоногих, энтомологические обзоры 2023 года

Насекомые существенно превосходят другие группы по количеству видов, занимая доминирующее положение в биоразнообразии. Это отражает их успешную адаптацию и эволюционные достижения.

Доминирование насекомых подтверждает их ключевую роль в экосистемах, в то время как паукообразные и ракообразные важны для поддержания равновесия в разных средах.

Питание и разнообразие ротового аппарата

.01

Ротовой аппарат грызущего типа характерен для жуков и муравьёв, позволяя эффективно перерабатывать твёрдую растительную пищу и мелких беспозвоночных.

.02

Лижущий тип, присущий пчёлам, обеспечивает сбор нектара и пыльцы, сочетая питание с опылением растений, что важно для экосистемы.

.03

Колюще-сосущие аппараты имеют комары и вши, позволяя им прокалывать ткани и высасывать соки хозяев, что часто делает их переносчиками заболеваний.

.04

Фильтрующий ротовой аппарат встречается у водных ракообразных, таких как дафнии, пропускавая воду и задерживая пищевые частицы, что облегчает питание в водной среде.

Размножение и жизненные циклы членистоногих



Половое размножение с выраженным полом

Большинство членистоногих размножаются половым путём, при этом самцы и самки имеют чётко различимые признаки и выполняют специализированные функции в передаче генов будущему потомству.



Метаморфоз у насекомых

Жизненный цикл включает стадии яйца, личинки, куколки и взрослой особи, что позволяет эффективно использовать разные экологические ниши и снижает конкуренцию между поколениями.



Забота о потомстве у некоторых видов

Некоторые членистоногие, например муравьи и пчёлы, проявляют заботу о потомстве, охраняя и обеспечивая питание личинок, что повышает выживаемость молодого поколения.

Линька: процесс роста у членистоногих

.01

Линька необходима для роста, так как твёрдый хитиновый покров не позволяет увеличиваться в размерах без его смены.

.02

В период линьки организм становится уязвимым, поэтому многие виды ищут укрытия или впадают в состояние покоя для защиты.

.03

Количество линек варьируется у разных представителей и зависит от условий среды и генетических особенностей, часто достигает от трёх до пяти за жизнь.

Роль членистоногих в природе



Опыление цветущих растений обеспечивается в основном насекомыми, что способствует плодоношению и поддержанию биоразнообразия.



Членистоногие регулируют популяции других организмов, предотвращая размножение вредных видов и ускоряя разложение органических материалов.



Они служат питательной базой для многих животных, включая птиц и рыб, играя важную роль в пищевых цепях различных экосистем.

Значение членистоногих для человека



Опыление и сельское хозяйство

Пчёлы являются незаменимыми опылителями большинства культур, способствуя высоким урожаям и устойчивости агроэкосистем. Их деятельность напрямую связана с продовольственной безопасностью.



Производство продуктов

Членистоногие, такие как тутовый шелкопряд и кошениль, используются для получения шёлка и натуральных красителей, являясь важными ресурсами в текстильной и косметической промышленности.



Вред и болезни

Некоторые виды, например саранча и колорадский жук, причиняют значительный ущерб посевам. Малярийные комары и клещи переносят опасные заболевания, что требует контроля их популяций.




Научное и медицинское значение

Изучение членистоногих и их поведения позволяет разрабатывать эффективные методы борьбы с вредителями и переносчиками болезней, а также использовать их биологические свойства в медицине.

Жизненный цикл насекомого с полным превращением

Схематическое изображение стадий развития с указанием функций и изменений организма



Приспособления к защите и выживанию

.01

Ядовитые железы позволяют скорпионам и осам эффективно защищаться и охотиться, отпугивая хищников благодаря болезненным укусам.

.02

Твёрдый панцирь у ракообразных служит прочной защитой от механических повреждений и нападений хищников в водной среде.

.03

Маскировка и покровительственная окраска помогают членистоногим сливаться с окружающей средой, снижая риск быть замеченными и съеденными.

.04

Формирование социальных сообществ, таких как ульи и муравейники, обеспечивает коллективную защиту и эффективное взаимодействие в сложных условиях среды.

Интересные факты о членистоногих



Размах крыльев бабочки-совки

Агриппина обладает одним из крупнейших у насекомых размахом крыльев — приблизительно 30 сантиметров. Это делает её заметным и впечатляющим представителем насекомых.



Кокосовый краб — гигант суши

Самое крупное сухопутное членистоногое может весить до 4 килограммов. Этот краб отличается мощным панцирем и способностью лазать по деревьям в поисках пищи.



Строительство сложных жилищ

Насекомые, например термиты и муравьи, сооружают высокие термитники и обширные муравейники, демонстрируя коллективное поведение и организованное разделение труда.

Членистоногие: горизонты изучения и значение

Изучение членистоногих раскрывает секреты их адаптации и экологической важности, открывая новые возможности в науке, медицине и сельском хозяйстве для будущих поколений.