


Возникновение многоклеточных организмов

От одноклеточности к сложным формам жизни через
появление тканей и органов.



Жизнь на Земле до многоклеточных



За 2,5 миллиарда лет
одноклеточные, такие как
бактерии и археи, доминировали,
разнообразно питаясь и
размножаясь делением, сохраняя
простое строение.



Появление первых многоклеточных организмов



Эдиакарский период – начало многоклеточности

Около 600 миллионов лет назад в эдиакарских отложениях впервые появились многоклеточные организмы. Эти морские животные демонстрируют ранние формы жизни с разнообразными структурами и размерами.



Геологические находки в Австралии

Формирования Эдиакара в Австралии сохранили древние останки мягкотелых организмов, которые служат важными доказательствами существования ранних многоклеточных животных.



Открытия в Канаде и России

В Прекрасном озере (Канада) и на Беломорье (Россия) нашли ископаемые многоклеточных с огромным разнообразием форм и размером до 1,5 метра, что подтверждает их древность и сложность.

Причины возникновения многоклеточности

01

Нехватка питательных веществ и ограниченное пространство заставили одноклеточные объединяться в общие структуры для выживания.

02

Увеличение кислорода в атмосфере и воде обеспечило энергетическую базу для развития более сложных организмов с несколькими клетками.

03

Симбиотические отношения между клетками способствовали возникновению кооперации и началу специализации функций внутри колоний.

04

Потребность в защите от внешних факторов привела к формированию клеточных объединений с разделением задач и усиленной защитой.


Геохронологическая шкала появления многоклеточных



Период эдиакарской биоты обозначает начало многоклеточности, следом резко возрастает разнообразие животных в кембрийский период.



Рост видов связан с появлением многоклеточных и улучшением условий для жизни на планете.



Геологические исследования, 2023

Примеры древних многоклеточных организмов



Dickinsonia — с плоским сегментированным телом

Dickinsonia была плоским организмом с отчетливыми сегментами и достигала значительных размеров. Этот вид жил на морском дне, питаясь органическими остатками.



Charniodiscus с дискообразным основанием

Charniodiscus имел основание в виде диска и тонкий стебель с ветвистыми отростками. Обитал на морском дне, вероятно, фильтруя питание из воды.



Spriggina с членистым телом

Spriggina представляла организм с отчетливо членистым телом и головной частью. Это свидетельствует о начале сложности форм и функциональности у древних многоклеточных.



Сравнение одноклеточных и многоклеточных организмов

Основные отличия по количеству клеток, организации и функциям питания и защиты.

Многоклеточные обладают большей сложностью и функциональным разделением, что обеспечивает их эффективность.

Аспект	Одноклеточные	Многоклеточные
Количество клеток	1	Много
Структура	Простая	Сложная, с специализацией
Питание	Примитивное	Разнообразное
Защита	Отсутствует коллективная	Развитые механизмы
Примеры	Бактерии, амёбы	Животные, растения, грибы

Преимущества многоклеточности для жизни на Земле

01

Большие размеры и разнообразие среды обитания дают многоклеточным преимущество в освоении планеты.

02

Специализация тканей и органов улучшает использование ресурсов и жизненные функции, повышая выживаемость.

03

Коллективная защита от угроз и адаптивность способствуют успешной эволюции и распространению видов.

Клеточная специализация и коммуникация



Специализация клеток

В многоклеточных клетках развиваются уникальные функции: защита, движение и транспорт веществ обеспечивают комплексное функционирование организма.

Межклеточная коммуникация

Клетки обмениваются сигналами через химические вещества и специальные соединения, что координирует их работу и поддерживает жизненные процессы.



Рост разнообразия форм жизни после появления многоклеточных

Кембрийский взрыв характеризуется резким появлением сложных животных с защитными структурами и хищным образом жизни.

Этот период стал ключевым этапом в эволюционной истории, задав новый уровень биологического разнообразия.



Палеонтологические данные, 2023

Основные гипотезы возникновения многоклеточности

01

Синцитиальная гипотеза предполагает, что многоклеточные произошли из крупных одноклеточных организмов с множеством ядер, которые затем разделились на отдельные клетки.

02

Колониальная гипотеза объясняет возникновение многоклеточности через объединение одиночных клеток в колонии с последующей специализацией и координацией их функций.

03


Ученые продолжают обсуждать, какой путь был первичным, поскольку обе гипотезы подкреплены наблюдениями за современными микроскопическими организмами.

Колонии одноклеточных как прообраз многоклеточности



Вольвокс — живая модель перехода к многоклеточности

Вольвокс формирует шаровидные колонии из тысяч клеток, соединённых между собой. Некоторые клетки несут ответственность за движение, а другие — за размножение, что демонстрирует начало клеточной специализации.




Значение колоний в эволюционном развитии

Колонии одноклеточных обеспечивают защиту и взаимодействие между клетками, формируя первые шаги к сложной многоклеточной организации, давая представление об эволюционных механизмах перехода к комплексным организмам.

Стадии перехода от одноклеточности к многоклеточности

✕ Этапы развития многоклеточности на основе эволюционных исследований



Важные аспекты роли кислорода в развитии многоклеточных

			
Накопление кислорода Увеличение уровня кислорода 2–1,5 млрд лет назад обеспечило условия для аэробного дыхания, увеличивая энергетический потенциал клеток.	Аэробное дыхание Это более эффективный способ получения энергии, позволяющий поддерживать крупные и сложные структуры организмов.	Рост сложности организмов Повышенный энергообмен способствовал эволюции многообразных тканей и органов в многоклеточных существах.	Временная корреляция Появление кислорода совпадает с первыми признаками многоклеточности, указывая на важность газового компонента для эволюционного прорыва.

Следы и окаменелости древних многоклеточных



Dickinsonia — гигантская древняя форма жизни

В Австралии обнаружены крупные остатки Dickinsonia длиной до 1,5 метров, что говорит о значительном размере животных в позднем Эдиакарии. Это свидетельствует о разнообразии и масштабах ранних многоклеточных.



Многообразие форм в Прекрасном озере

Окаменелости из канадского Прекрасного озера демонстрируют разнообразие эдиакарских организмов с разной морфологией, подтверждая широкое распространение многоклеточных в древних морях.



Беломорские находки как вклад российской науки

В Беломорье обнаружены следовые отпечатки и останки, подтверждающие активную жизнедеятельность многоклеточных организмов на морском дне позднего Эдиакария.



Влияние многоклеточности на экосистемы древности

01

Образование сложных пищевых цепей из-за разнотипных организмов привело к увеличению биоразнообразия и устойчивости экосистем.

02

Возникновение новых экологических ниш обеспечило разнообразие условий проживания и способов жизни для организмов разных типов.

04

Увеличение биомассы привело к формированию органических осадков, закладывая основу будущих залежей ископаемого угля и нефти.

03

Ускорился круговорот углерода и других элементов, что повлияло на глобальные биогеохимические циклы того времени.

Современное значение многоклеточных организмов

01

Большинство растений, животных и грибов являются многоклеточными и составляют основу жизни на Земле.

02

Они формируют биоценозы, участвуют в почвообразовании и обеспечивают взаимосвязи в экосистемах.

03

Многоклеточные поддерживают устойчивость природы, способствуя разнообразию и правильному функционированию экологических систем.

Основные типы современных многоклеточных и их характеристики

- ✕ Сравнение представителей трёх царств многоклеточных по главным признаками.
- ✕ Каждая группа обладает уникальными тканями и способами размножения, отражая адаптации к различным средам и образу жизни.


Группа	Основные особенности	Тип тканей	Размножение
Растения	Корни, листья, фотосинтез	Проводящие, покровные, основные	Споровое и половое
Животные	Движение, нервная система	Мышечные, нервные, эпителиальные	Половое, иногда бесполое
Грибы	Разложение органики	Гифы, мицелий	Споровое, иногда половое

Исторические открытия и вклад учёных



Вклад Владимира Ковалевского

Исследования палеонтолога Владимира Ковалевского значительно расширили понимание происхождения и эволюции многоклеточных животных на ранних этапах истории Земли.




Открытия в Австралии и России

Микрофоссилии, найденные в Австралии и Беломорье, помогли уточнить возраст и характеристики первых многоклеточных, что стало важным вкладом мировой науки.



Международные научные экспедиции

Совместные работы учёных из разных стран на территориях Австралии, Канады и России выявили сотни новых видов эдиакарской биоты, расширяя знания о древних экосистемах.



Многоклеточность — ключ к биологическому разнообразию

- Переход к многоклеточности стал важным этапом эволюции, заложив основы сложных организмов и разнообразия, которые сформировали современный живой мир на Земле.