

Степенная функция с натуральным показателем

Как меняется число при возведении в степень?





+ Зачем нужны степенные функции

Степенная зависимость помогает увидеть, как повторное умножение меняет результат. Она встречается в геометрии, при построении графиков и в простых вычислениях, где важно понимать, как растут числа при разных показателях степени.



Определение степенной функции

1/ Общий вид

Степенная функция с натуральным показателем записывается как $y = x^n$. Здесь x — переменная, а n показывает, сколько раз число умножается само на себя.

2/ Показатель степени

Число n называют показателем степени. От его значения зависит поведение функции: при $n = 1$ получается прямая $y = x$, а при больших n график заметно меняется.

3/ Простые примеры

Если $n = 2$, получаем $y = x^2$; если $n = 3$ — $y = x^3$. Эти частные случаи чаще всего изучают первыми, потому что по ним удобно сравнивать графики.

4/ Значение функции

Основание степени — это x , а значение функции зависит от выбранного числа. Подставляя разные x , можно увидеть, как быстро растут или меняются результаты.

Частные случаи степенной функции

n	Функция	График	Особенность
1	$y = x$	прямая	через (0; 0)
2	$y = x^2$	парабола	симметрия по Oy
3	$y = x^3$	кубическая	I и III четверти
4	$y = x^4$	узкая U-форма	значения ≥ 0



Сравним несколько простых степенных функций и их графики.

Чётность показателя влияет на форму графика, его симметрию и знак значений функции.



Только неотрицательные значения

При чётном n значения $y = x^n$ не бывают отрицательными. Даже если x отрицательное, после умножения число становится положительным, поэтому график не опускается ниже оси Ox .

Одинаковые результаты

Для чётной степени числа 2 и -2 дают одинаковый результат: $2^4 = 16$ и $(-2)^4 = 16$. Это помогает сразу заметить симметрию графика.


Опорные точки

График обязательно проходит через точки $(0; 0)$ и $(1; 1)$. По ним удобно проверять правильность построения и быстро находить место графика на координатной плоскости.

Симметрия относительно Oy

Если взять x и $-x$, значения функции будут одинаковыми. Поэтому левая и правая части графика совпадают зеркально относительно оси Oy .

График при чётном показателе



⬅ ➡ График при нечётном показателе

1/ Знак сохраняется

При нечётном n знак результата совпадает со знаком числа x . Положительное основание даёт положительное значение, а отрицательное — отрицательное, как в примере $(-2)^3 = -8$.

2/ Прохождение через начало


График любой нечётной степенной функции проходит через точку $(0; 0)$. Это одна из главных опорных точек, по которой удобно проверять построение.

3/ Расположение четвертей

Часть графика с положительными x находится в I четверти, а с отрицательными x — в III четверти. Поэтому кривая выглядит как плавный переход через начало координат.

4/ Простейший пример

Самая известная функция такого вида — $y = x^3$. Её график помогает понять, как ведут себя все остальные степенные функции с нечётным показателем.






Рост значений при $x = 2$

При одном и том же основании каждое новое увеличение показателя даёт заметный скачок результата. Это удобно видеть на последовательности степеней двойки.



Если x больше 1, значения степенной функции растут очень быстро, а каждый следующий шаг усиливает результат.



Вычисления по степеням 2: $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$



Что происходит при $0 < x < 1$

1/ Степени уменьшают число

Если x находится между 0 и 1, то при увеличении показателя n значение x^n становится меньше. Чем больше степень, тем ближе результат к нулю.

2/ Наглядные примеры


Например, $0,5^2 = 0,25$, а $0,5^3 = 0,125$. Видно, что при переходе к более высокой степени число заметно уменьшается, хотя основание остаётся тем же.

3/ Постепенное приближение к нулю

Для маленьких положительных чисел большие степени дают очень малые значения. Поэтому точки графика всё ближе подходят к оси Ox , не пересекают её.


4/ Поведение графика

Такой график становится почти прижатым к оси Ox , особенно при больших n . Это важно помнить, чтобы не ожидать от функции быстрого роста.



Построение графика степени

Алгоритм вычисления и проверки вида графика $y = x^n$





Область определения и область значения



Область определения

Для функции $y = x^n$ при натуральном n можно подставлять любое действительное число. Поэтому область определения состоит из всех чисел на координатной прямой.



Область значений

При чётном показателе значения не бывают отрицательными, то есть $y \geq 0$. При нечётном показателе возможны любые действительные значения, положительные и отрицательные.



Точка начала координат


Точка $(0; 0)$ принадлежит графику любой степенной функции с натуральным показателем. Она служит удобной опорой для построения и проверки рисунка.



Как график «зеркалит» сам себя


Левая и правая части совпадают

Если показатель чётный, то график словно складывается пополам по оси Oy . Значения при x и $-x$ одинаковы, поэтому правая ветвь повторяет левую. На рисунке это сразу заметно по ровной, симметричной форме.




Поворот на 180°


При нечётном показателе график не отражается в зеркале, а как будто поворачивается вокруг начала координат. После такого поворота он остаётся тем же самым. Именно поэтому его удобно узнавать по парным точкам в I и III четвертях.



Как симметрия помогает на уроке

По виду графика можно быстро понять, к какому типу относится функция, даже если формула не записана рядом. Достаточно проверить, совпадают ли части относительно оси Oy или сохраняется ли вид после поворота вокруг точки $(0; 0)$.





Свойства функции $y = x^n$

n	Чётность	Симметрия	Значения	Примеры
2, 4, ...	чётное	отн. Oy	$y \geq 0$	x^2, x^4
3, 5, ...	нечётное	отн. (0; 0)	все числа	x^3, x^5

Таблица показывает, как чётность показателя влияет на симметрию, область значений и общий вид графика.

Чётность показателя почти полностью определяет поведение графика и множество возможных значений функции.



Как выглядят разные степени

— $y = x$ — прямая

Это самый простой случай степенной функции. График проходит через начало координат и идёт по диагонали, поэтому служит отправной точкой для сравнения с более сложными степенями.



$y = x^2$ — парабола

При квадрате график поднимается вверх с обеих сторон от нуля. Он не уходит ниже оси Ox и выглядит как плавная U-образная линия с осью симметрии.



$y = x^3$ и выше

Нечётные степени дают S-образный график, а при увеличении показателя линии около нуля становятся более плоскими. Зато при больших $|x|$ значения растут или убывают быстрее.




Значения двух функций при одинаковых x

Сравнение удобно начинать с одинаковых значений аргумента, чтобы увидеть разницу между чётной и нечётной степенью на одной шкале.



У квадрата значения по обе стороны от нуля совпадают, а у куба меняют знак вместе с x .



Вычисления по значениям $x = -2, -1, 0, 1, 2$

⬅ ➡ Как вычислять значения степени

1/ Запиши степень


Сначала нужно понять, что означает запись x^n : число x умножается само на себя n раз. Это помогает не перепутать степень с обычным умножением и верно выбрать порядок действий.

2/ Внимательно смотри на скобки

Скобки определяют знак результата. В выражении $(-3)^2$ сначала возводят в степень число -3 целиком, а без скобок сначала считается степень, а затем ставится минус.


3/ Проверь результат

Для контроля полезно проверить знак и величину ответа на простых примерах. Если степень чётная, отрицательное число даёт положительный результат; если нечётная — знак сохраняется.



Как понять знак и форму графика

Схема показывает, как по чётности показателя определить вид графика функции $y = x^n$.





Степень в геометрии и вокруг нас

Площадь квадрата


Формула $S = a^2$ показывает, что площадь зависит не просто от стороны, а от её квадрата.

Если сторону увеличить в 2 раза, площадь вырастет в 4 раза. Это наглядно объясняет, почему маленькое изменение размера даёт заметный результат.




Объём куба

Для куба используется формула $V = a^3$, и здесь связь со степенью ещё сильнее. Когда ребро увеличивается в 2 раза, объём становится в 8 раз больше. Такой пример помогает увидеть, как быстро растут величины в трёхмерном пространстве.



Математика в измерениях

Степени встречаются не только в задачах, но и в реальных измерениях: площади, объёмы, масштабы моделей. Поэтому тема помогает связывать алгебру с геометрией и понимать, почему одни величины растут быстрее других.





— Путают минус и скобки

В выражениях $-x^n$ и $(-x)^n$ порядок действий разный. Без скобок сначала считают степень, а потом ставят минус, поэтому знак ответа может получиться совсем другим.

— Забывают про нечётную степень

Если показатель нечётный, знак сохраняется. Поэтому $(-2)^3 = -8$, и это удобно проверять по правилу: число с минусом в нечётной степени остаётся отрицательным.

— Неверно считают чётную степень

При чётном показателе отрицательное число в скобках даёт положительный результат. Например, $(-2)^4 = 16$, а не -16 , потому что множители попарно дают плюс.

— Не замечают роль нуля

Ноль в любой натуральной степени остаётся нулём: $0^5 = 0$. Это важно помнить при построении графиков, чтобы не ожидать роста или изменения знака в точке $x = 0$.

Типичные ошибки при работе со степенями



Мини-проверка по теме

Выражение	Значение	Вывод
$(-2)^4$	16	чётная степень
$(-2)^3$	-8	сохраняет знак
0^5	0	ноль остаётся нулём
3^2	9	повторное умножение

Вычисления по правилам возведения в натуральную степень



Проверь, как работает чётность степени, знак числа и значение выражения в простых примерах.

Ответ зависит от основания, скобок и чётности показателя; эти три признака помогают быстро проверять вычисления.

Что важно запомнить

Степенная функция с натуральным показателем помогает видеть связь между формулой, графиком и вычислениями. Чётность показателя определяет симметрию, знак значений и общий вид кривой.