



# Обзор: многообразие биогеоценозов и их значение

Биогеоценозы — устойчивые природные системы с разнообразием живых организмов и среды.




# Происхождение и значение термина «биогеоценоз»

Термин введён В. Сукачёвым в 1942 году для описания устойчивых природных систем, где живые организмы и неживая среда образуют единство. Понимание биогеоценозов фундаментально для экологии и охраны природы.



**biogeocenosis**

# Основные компоненты биогеоценоза



## Биотические составляющие

Живые организмы биогеоценоза включают растения — продуценты, обеспечивающие энергию; животных — консументов, питающихся растениями; и микроорганизмы — редуцентов, ответственных за разложение органики.



## Абиотические факторы

Неживые элементы биогеоценоза — почва, вода, воздух и климат. Они создают условия для жизни и участвуют в обмене веществ и энергии, формируя среду обитания.



## Взаимосвязи компонентов

Связи между живой и неживой частью реализуются через цепочки питания, круговороты веществ и динамику численности, обеспечивая устойчивость экосистемы.



# Классификация биogeоценозов

## Основные типы биogeоценозов

Существуют разные типы биogeоценозов: лесные, степные, тундровые, пустынные, горные и водно-болотные, каждый с уникальными условиями и живыми сообществами.

## Географические примеры

Например, тайга Сибири — типичный лесной биogeоценоз, степи Казахстана характеризуют луговой тип, а пустыни Каракумов представляют аридную экосистему.

# Лесные биогеоценозы: характеристики и значимость



## Тайга России

Тайга — крупнейший массив хвойных лесов, покрывающий северные территории страны. Она играет важную роль в глобальных циклах углерода и кислорода, поддерживая климат и биоразнообразие.



## Тропические леса Амазонки

Амазонка — мировой центр биоразнообразия с многочисленными видами растений и животных. Лес выполняет функции климатической регуляции и защиты от эрозии.



## Бореальные леса Канады

Бореальные леса Канады объединяют хвойные и лиственные виды. Они важны для стабилизации почв, водного баланса и сохранения разнообразия экосистем.

# Особенности тундровых биогеоценозов

Тундры занимают северные области Евразии и Северной Америки, характеризуются вечной мерзлотой и коротким вегетационным сезоном. Здесь преобладают мхи, лишайники и травянистые растения.



Эти экосистемы исключительно чувствительны к климатическим изменениям. Потепление нарушает устойчивость и приводит к изменениям видового состава, что влияет на весь природный баланс.

# Адаптации пустынных биогеоценозов



## Растения пустынь

Пустынные растения освоили экстремальные условия: они являются ксерофитами и суккулентами, способными сохранять влагу. Их особые корневые системы и восковой налёт защищают от испарения.



## Животные пустынь


Животные привыкли к жёсткому климату, проявляя ночную активность и экономию влаги. Примеры включают пустынных грызунов, рептилий и насекомых, адаптированных к жаре и засухе.

# Разнообразие и масштабы биогеоценозов России



1. Россия охватывает многие природные зоны: тундру, тайгу, лесостепи, степи и полупустыни, что способствует выдающемуся биоразнообразию в Евразии.

2. На территории обитает свыше 11 400 видов сосудистых растений, более 300 млекопитающих и свыше 780 видов птиц. Наибольшая площадь покрыта тайгой и тундрой.



# Механизмы связей в биогеоценозах



## Пищевые цепи

Энергия передаётся от растений к животным и микроорганизмам, формируя основу экосистемы и обеспечивая баланс между популяциями.



## Симбиоз и взаимовыгодные отношения

Примеры включают микоризу, где грибы помогают корням деревьев усваивать питательные вещества, и лишайники — союз гриба и водоросли.



## Конкуренция и хищничество

Взаимодействия, влияющие на численность видов и распределение ресурсов, способствуют поддержанию биологического разнообразия и динамической стабильности.



## Влияние абиотических факторов

Климат, почва, влажность и освещение формируют среду для жизни, определяя возможности существования и развития организмов.

# Степные биогеоценозы: особенности и роль



## ● Ландшафт и климат степей

Степи характеризуются сухим континентальным климатом и доминированием злаковых трав. Часто возникают засухи, что формирует специфику растительного покрова и животного мира.

## ● Экономическое и экологическое значение

Степи служат ценными пастбищами и сенокосами для традиционного скотоводства. Однако они уязвимы к распашке, эрозии и чрезмерному выпасу, требуя мер защиты и устойчивого использования.

# Горные биогеоценозы: особенности и устойчивость



## Выраженная высотная поясность в горах

В горных биогеоценозах отмечается чёткое разделение растительности по высоте — от густых смешанных и хвойных лесов у подножия до скал и тундровых растений на вершинах. Такая поясность формирует уникальные экосистемы с разным климатом и почвенными условиями.



## Эндемичность и редкие виды

Горные территории отличаются высокой концентрацией эндемиков — видов, не встречающихся больше нигде. Это связано с изолированностью и разнообразием условий, что делает эти биогеоценозы особо ценной частью природного наследия.



## Влияние антропогенных факторов

Горные экосистемы уязвимы к деятельности человека: туризм, вырубка лесов и изменение климата приводят к деградации и снижению биоразнообразия. Их восстановление требует защиты и особых мер управления.

# Водно-болотные биогеоценозы: роль и угрозы

Водно-болотные биогеоценозы включают болота, озёра и пойменные луга, которые выполняют важные функции фильтрации воды и поддержания гидрологического баланса. Они обильно заселены множеством видов птиц и водных организмов.



Эти экосистемы страдают от осушения, загрязнения и интенсивной застройки, что ведёт к потере мест обитания и снижению биоразнообразия. Защита и восстановление водно-болотных территорий — актуальная экологическая задача.

# Угрозы биogeоценозам: исчезновение и деградация

**1** Вырубка лесов приводит к сокращению площади тропических и бореальных лесов, что уменьшает биоразнообразие и нарушает климатические функции экосистем.

**2** Расчистка земель под сельское хозяйство и урбанизация вызывают фрагментацию природных территорий, ухудшая целостность и устойчивость биogeоценозов.

**3** Загрязнение воздуха и воды оказывает токсическое воздействие на организмы сообщества, снижая численность и изменяя структуру видов.

**4** Потеря болот и саванн ведёт к эрозии почв, уменьшению запасов углерода и снижению качества среды обитания для многих животных.

# Экологическое значение биогеоценозов

---

Биогеоценозы играют ключевую роль в глобальных циклах воды и углерода, аккумулируя значительную часть атмосферного CO<sub>2</sub> и регулируя влажность и температуру местности.

---

Они способствуют предотвращению природных бедствий — наводнений и засух, а также поддерживают плодородие почв, что важно для сельского хозяйства и устойчивого развития.

---



# Экосистемные услуги: экономический и социальный вклад



## Обеспечение продовольственной безопасности

Биогеоценозы поддерживают сельское хозяйство, обеспечивая опыление культур и восполнение почвенного плодородия. Пчёлы, опыляющие более 70% растений, являются важным звеном в производстве 40% мировых продуктов питания.



## Ресурсы для медицины и промышленности

Растения и микроорганизмы из различных биогеоценозов служат источником лекарственных веществ и сырья для промышленных технологий. Кроме того, природные территории предоставляют возможности для отдыха и экотуризма, увеличивая социально-экономическую ценность.

# Меры по сохранению биогеоценозов

## XX век — создание заповедников

В СССР и мире начали формироваться первые заповедники, охраняющие уникальные территории с заповедным режимом и запрещением хозяйственной деятельности.

## Конец XX — начало XXI века — развитие национальных парков

Создание национальных парков позволило совмещать охрану природы с экологическим туризмом и научным мониторингом биогеоценозов.

## Современные методы — устойчивое землепользование

Внедряются агролесомелиорация и севообороты, направленные на сохранение плодородия почв и уменьшение деградации экосистем.

## Экологический контроль и законодательство

Ужесточение норм по вырубке лесов, загрязнению и использованию природных ресурсов способствует защите и восстановлению биогеоценозов.

# Восстановление биогеоценозов: современные подходы

Основные методы включают массовую посадку деревьев и рекультивацию нарушенных территорий, что способствует восстановлению структур и функций экосистем.



Активно применяются биоремедиация загрязнённых участков и программа реинтродукции исчезающих видов, способствующие возвращению биоразнообразия и экологического равновесия.

# Мировой опыт охраны биогеоценозов

## ● — 1971 год — Рамсарская конвенция

Международный договор направлен на сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий мирового значения.

## ● — 2021–2030 — Декада восстановления экосистем ООН

Глобальная программа предусматривает мероприятия по восстановлению лесов, болот и пахотных земель для улучшения состояния биоразнообразия и климата.

## ● — Современные программы ЕС — Natura 2000

Сеть охраняемых территорий в Европе объединяет усилия стран для защиты регионального биоразнообразия и устойчивого управления природными ресурсами.

# Влияние человеческой деятельности на биогеоценозы

1

Индустриализация и строительство нарушают целостность природных ландшафтов, приводя к фрагментации и утрате важных местообитаний.

2

Интенсивное сельское хозяйство с использованием пестицидов и удобрений ухудшает качество почв и снижает численность многих видов.

3

Загрязнение воздуха и изменение гидрологических режимов нарушают природные циклы, способствуя снижению биомассы и продуктивности экосистем.

# Значение и перспективы сохранения биогеоценозов

Сохранение разнообразия биогеоценозов является ключом к устойчивому развитию и поддержанию жизни на планете, требуя активных усилий общества и государства для будущих поколений.

