
Цитоплазма: энергетический и опорно-сократительный аппараты клетки

Динамическая среда клетки, объединяющая энергию и структурную поддержку.





+ Истоки и развитие ПОНЯТИЯ ЦИТОПЛАЗМЫ

Термин «цитоплазма» обозначает содержимое клетки без ядра. Это универсальная среда, где органоиды и цитозоль взаимодействуют, обеспечивая жизнедеятельность. Изучение цитоплазмы стало ключом к пониманию метаболизма, транспорта и деления клеток.



Основные компоненты цитоплазмы: цитозоль и органоиды

Цитозоль — матрикс жизни клетки

Цитозоль — это полужидкая фаза цитоплазмы, где растворены ионы и молекулы. Он обеспечивает среду для биохимических реакций и транспорт веществ внутри клетки.



Мембранные органоиды: специализированные структуры

Органоиды с мембранами, такие как митохондрии и аппарат Гольджи, выполняют специализированные функции, от энергетического обмена до транспорта и модификации молекул.



Немембранные компоненты: каркас и синтезаторы

К немембранным относятся рибосомы, центриоли и элементы цитоскелета, обеспечивающие синтез белка, структурную поддержку и деление клетки.



Органоиды: классификация и функции

Органоид	Тип мембран	Основная функция
Митохондрии	Двойная	Синтез АТФ, дыхание
ЭПС	Одинарная	Синтез белков/липидов
Аппарат Гольджи	Одинарная	Модификация и сортировка
Лизосомы	Одинарная	Расщепление веществ
Пероксисомы	Одинарная	Окисление и детоксикация
Рибосомы	Нет	Синтез белка
Цитоскелет	Нет	Опора и движение



Таблица сравнивает основные органоиды по типу мембран и основным функциям в цитоплазме.


Разнообразие мембранных и немембранных органоидов обеспечивает комплексное выполнение клеточных функций.



Митохондрии: строение и ключевая роль в энергетике

Двухмембранная структура и внутренняя организация

Митохондрии имеют внешнюю и внутреннюю мембрану, внутренняя образует кристы для увеличения поверхности. В матриксе сосредоточены ферменты цикла Кребса и собственная ДНК органоида.




Функции в обеспечении энергии и адаптации

Главная задача митохондрий — производство АТФ путем окислительного фосфорилирования. Их количество варьируется в зависимости от энергетических потребностей тканей, например, в мышцах и печени.





Энергетика цитоплазмы и роль митохондрий



Митохондрии производят до 90% клеточного АТФ, обеспечивая основную энергию для жизненных процессов.

- Гликолиз протекает в цитозоле,
- тогда как цикл Кребса и
- дыхательная цепь происходят внутримитохондриально.

- Патологии митохондрий
- связаны с тяжелыми
- заболеваниями, их
- материнская
- наследственность позволяет
- изучать эволюцию.



ЭПС: два типа, разные функции

Шероховатая ЭПС и синтез белка

Снабжённая рибосомами шероховатая ЭПС ответственна за производство мембранных и секретируемых белков, играя ключевую роль в клеточном обмене.



Гладкая ЭПС в липидном обмене и детоксикации

Гладкая ЭПС производит липиды и стероиды, хранит ионы кальция, участвует в обезвреживании токсинов, особенно в клетках печени.





Аппарат Гольджи: узел переработки и транспорта

1/

Модифицирует и сортирует белки и липиды, поступающие из ЭПС, подготавливая их для последующего назначения.

3/

Образует первичные лизосомы, обеспечивая внутриклеточное переваривание и обновление компонентов клетки.

2/

Упаковывает молекулы в везикулы для транспорта к лизосомам, плазматической мембране или на экспорт за пределы клетки.

4/

Критически важен для секреции веществ и поддержания состава клеточной мембраны.






Схема транспортных путей между органоидами

По материалам современных исследований клеточного транспорта





Лизосомы: расщепление и обновление веществ



Лизосомы содержат ферменты, расщепляющие макромолекулы, участвуя в переработке старых и повреждённых компонентов клетки.

Процесс аутофагии обеспечивает очистку клеточного содержания, поддерживая гомеостаз и здоровье клетки.

Генные нарушения лизосом ведут к накоплению дефектных веществ и развитию наследственных заболеваний.




Пероксисомы: окислительно- восстановительны е реакции и детоксикация

Пероксисомы — мелкие органоиды размером от 0,1 до 1 мкм, содержащие ферменты, участвующие в окислительных процессах, например, каталазу и различные оксидазы.

Главная функция пероксисом — расщепление длинноцепочечных жирных кислот с образованием перекиси водорода, которая сразу разлагается каталазой, предотвращая токсичность.

Эти органоиды важны для детоксикации алкоголя и лекарств в печени; их нарушения вызывают заболевания обмена веществ, включая тяжёлый синдром Целлвегера.






Цитоскелет: архитектура и функции клетки


Актиновые филаменты: мобильные силовые структуры

Актиновые филаменты обеспечивают гибкость и форму клетки, участвуют в её движении и процессах деления. Они образуют микроворсинки и соединяются с другими белками для сокращения мышц.




Микротрубочки: транспортные трассы и клеточное деление

Микротрубочки формируют внутренние «пути» для перемещения органоидов и транспортных пузырьков, а также создают митотическое веретено, необходимое для равномерного распределения хромосом при делении.



Промежуточные филаменты: опорные элементы

Эти устойчивые белковые волокна придают клетке механическую прочность, защищая её от деформаций. Они связывают ядро и другие структуры, обеспечивая стабильность ткани и сопротивляемость стрессам.





АКТИНОВЫЕ ФИЛАМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ КЛЕТОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ


Актиновые филаменты управляют амёбoidным движением, позволяя клеткам изменять форму и перемещаться по окружающей среде для выполнения своих функций.

Они участвуют в формировании микроворсинок на поверхности клеток, увеличивая площадь и способствуя активным процессам всасывания веществ.



В процессе клеточного деления актин обеспечивает цитокинез — разделение цитоплазмы на две дочерние клетки после митоза.

- В мышечных клетках актин
- взаимодействует с миозином,
- формируя миофибриллы, что способствует сокращению и генерации силы.





Микротрубочки: транспорт и деление клетки

1/

Микротрубочки строятся из белков α - и β -тубулина, образуя динамичные структуры, регулирующие форму клетки и внутриклеточный транспорт.

2/

Они служат транспортными путями для перемещения митохондрий, аппарата Гольджи и везикул при помощи моторных белков, таких как кинезин и динеин.

3/

Формирование митотического веретена микротрубочками обеспечивает правильное распределение хромосом в дочерние клетки во время деления.

4/

В клетках с ресничками и жгутиками микротрубочки организуют их структуру, что важно для движения и очистки слизистых путей.



Промежуточные филаменты: стабильность и защита клетки


Промежуточные филаменты состоят из различных белков, таких как кератины, десмин, виментин и нейрофиламенты, формируя разнообразные структуры по типу ткани.

Они обеспечивают механическую прочность клетки, предотвращая повреждения при физическом воздействии и растяжении.



Эти филаменты связывают ядро клетки с плазмалеммой и межклеточными контактами, поддерживая целостность клеточных структур.

- Мутации и поломки
- промежуточных филаментов
- связаны с кожными заболеваниями, дистрофией мышц и нарушениями в нервной системе.





Научные открытия в динамике цитоскелета

2010: Внедрение GFP

Использование зелёного флуоресцентного белка позволило впервые визуализировать динамику цитоскелета в живых клетках и изучать изменения в реальном времени.

2015: Механизмы миграции

Исследования раскрыли, как цитоскелет перестраивается при клеточной миграции, что важно для понимания процессов заживления ран и развития опухолей.

2019: Роль в митозе

Углубленное изучение динамики микротрубочек и актиновых структур в митозе дало новые данные о регуляции клеточного деления и патологиях.

2023: Биомедицинские применения

Данные исследований стали ключевыми для развития тканевой инженерии и регенеративной медицины, улучшая способы восстановления повреждённых тканей.



Цитозоль: биохимическое пространство клетки

Цитозоль занимает до 85% объёма цитоплазмы, представляя собой водной раствор с растворёнными белками, ионами и органическими веществами.


В нём протекают

- многочисленные биохимические
- реакции, включая гликолиз,
- синтез аминокислот и поддержание осмотического баланса.

Цитозоль обеспечивает активный внутриклеточный транспорт веществ и поддерживает оптимальные условия для жизнедеятельности клетки.



Включения цитоплазмы: запасные и пигментные компоненты




Запасные включения представлены гранулами гликогена и липидными каплями, которые служат источниками энергии при дефиците питательных веществ.

Пигментные включения, такие как меланин и липофусцин, участвуют в защите клетки и часто выступают как индикаторы клеточного старения.

Отражая физиологическое состояние клетки, включения могут сигнализировать о метаболических нарушениях, например, об ожирении или возрастных изменениях.



Межклеточные связи: пути обмена через цитоплазму



Gap junctions у животных обеспечивают прямой транспорт ионов и низкомолекулярных веществ, поддерживая электрическую и химическую связь между соседними клетками.

Плазмодесмы у растений формируют симпластное единство, позволяя обмениваться питательными веществами и сигналами через клеточные стенки.

Ключевая роль цитоплазмы в клеточной биологии

Цитоплазма объединяет энергетические и структурные компоненты, поддерживая жизнеспособность и функцию клетки. Её изучение раскрывает основы биологии и помогает в медицинских инновациях.

