

Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами

Как защитить себя, распознать отравление и помочь до приезда медиков.



Почему это важно знать каждому школьнику

Опасные химические вещества могут встретиться не только на заводе, но и рядом с домом, в транспорте или в школьном кабинете химии. Знание простых правил помогает не растеряться и снизить риск тяжёлых последствий.



Что относится к аварийно химически опасным веществам

01

АХОВ — это токсичные газы, пары и жидкости, которые при аварии способны быстро вызвать острое отравление у человека.

02

К ним относят хлор, аммиак, фосген, сероводород, а также пары кислот и щелочей, опасные при утечке или испарении.

03

Такие вещества могут распространяться по воздуху и поражать людей даже на расстоянии от места аварии, если образуется облако.

Типичные АХОВ и их действие на организм

Краткая таблица помогает запомнить самые известные вещества и первые признаки их воздействия.

Во всех случаях важны быстрый выход из зоны заражения и обращение за помощью.

Вещество	Основное действие
Хлор	Раздражение глаз и дыхания
Аммиак	Жжение и спазм дыхания
Сероводород	Слабость, тошнота
Фосген	Опасное запоздание симптомов



Пути попадания яда в организм

Через дыхание


Самый опасный путь — вдыхание газа, пара или аэрозоля. Вещество быстро попадает в дыхательные пути и может вызвать кашель, удушье и слабость.

Через кожу, глаза и рот

Через кожу и глаза химикаты тоже действуют быстро: появляются ожог, боль и раздражение. При попадании внутрь через рот риск тяжёлого отравления особенно высок.

Алгоритм первых действий при аварии

Последовательность действий при обнаружении запаха, дыма или облака неизвестного вещества.



Признаки отравления, которые заметны сразу



Кашель и жжение

Часто первыми появляются кашель, першение в горле и жжение в дыхательных путях. Это сигнал, что воздух уже может быть опасным и нужно срочно уходить.



Слёзы и боль в глазах

Химические пары нередко вызывают слезотечение, покраснение и резь в глазах. Если вещество попало на слизистую, дискомфорт усиливается очень быстро.



Головокружение и слабость

При нарастании отравления человек может чувствовать тошноту, слабость и потерю устойчивости. Ему становится труднее идти, говорить и выполнять простые действия.



Тяжёлые симптомы

Одышка, посинение губ, сонливость, судороги и потеря сознания требуют срочной помощи. Иногда опасные признаки усиливаются не сразу, а через несколько часов.




Отсроченное ухудшение

Некоторые вещества особенно коварны тем, что сначала человек чувствует себя терпимо. Позже состояние резко ухудшается, поэтому наблюдение после контакта обязательно.

Как усиливается тяжесть отравления

Чем выше концентрация и дольше контакт, тем быстрее появляются тяжёлые нарушения дыхания и сознания.

Даже краткое воздействие сильного вещества может быть опаснее долгого контакта с более слабой дозой.



Безопасность спасателя и пострадавшего



Сначала — собственная защита

Ученик замечает резкий запах, но не спешит подходить ближе. Он отступает на безопасное расстояние, прикрывает дыхание тканью и оценивает, не идёт ли облако в его сторону. Только потом можно помогать другому.



Помощь без лишнего риска

Если рядом есть перчатки, очки или маска, их используют без задержки. Но главное — не входить в опасную зону без необходимости и не пытаться «проверить» неизвестное вещество руками или носом.



Простые средства рядом

Под рукой могут оказаться школьная аптечка, чистая вода, салфетки и телефон. Эти вещи помогают быстро вызвать помощь, защитить себя и промыть загрязнённые участки, не теряя драгоценное время.

Как вывести человека из зоны поражения

1. Обнаружить опасность

Увидев облако, дым или почувствовав резкий запах, нужно сразу прекратить движение в сторону источника и не задерживаться рядом.

3. Обеспечить покой

После выхода человеку дают тепло, покой и наблюдение до приезда взрослых и медиков, а при ухудшении состояния немедленно вызывают 112.

2. Выйти к свежему воздуху

Пострадавшего выводят поперёк направления ветра, избегая подвалов, низин и закрытых помещений, где могут скапливаться тяжёлые газы.

Первая помощь при поражении глаз, кожи и дыхания


Ситуация	Что делать
Глаза	Промывать 10–15 мин
Кожа	Снять одежду, мыть водой
Дыхание	Свежий воздух, покой

Первые минуты особенно важны: промывание водой, удаление загрязнённой одежды и выход на свежий воздух помогают снизить вред от многих веществ.

Вода и свежий воздух — самые доступные меры, которые нужно применить как можно раньше. Трение, задержка и самодельная «нейтрализация» опасны.

Алгоритм помощи при нарушении дыхания


Последовательность действий при подозрении на химическое отравление и нарушении дыхания



Безопасные и опасные действия при отравлении

При химическом поражении важна не только помощь, но и отказ от действий, которые могут усилить всасывание вещества или создать новую опасность.

Наибольшую пользу дают быстрый выход, промывание и вызов помощи. Ошибки, связанные с едой, рвотой и огнём, резко увеличивают риск осложнений.



Чего нельзя делать при отравлении АХОВ

Нельзя давать пострадавшему еду, напитки или алкоголь: это не помогает, а иногда затрудняет оценку состояния и может усилить вред.

01

Нельзя смазывать химические ожоги маслом, кремом или мазью и использовать нашатырный спирт: такие действия не устраняют причину повреждения.

03

Нельзя вызывать рвоту, если неизвестно, какое вещество попало в организм. При некоторых ядах это опасно для горла и дыхательных путей.

02

Нельзя оставаться в облаке, возвращаться за вещами или самостоятельно смешивать вещества. Сначала — безопасность и выход из зоны поражения.

04

Что может пригодиться до приезда медиков

Для первой помощи

В аптечке полезны одноразовые перчатки, стерильные салфетки, чистая вода, маска и ножницы. Эти предметы помогают быстро защитить себя и начать простые действия помощи.

Для связи и организации


Отдельно нужны телефон для вызова 112 и пакет для загрязнённой одежды. Важно заранее знать, где в школе или дома можно быстро взять воду и сообщить взрослым.



Что сильнее всего влияет на исход отравления

Даже при одном и том же веществе исход может отличаться из-за условий аварии и того, как быстро началась помощь.

Самые важные факторы — концентрация и время воздействия. Чем раньше человек покидает опасную зону, тем выше шанс избежать тяжёлых последствий.



Разбор школьной ситуации

1. Появился запах

В классе чувствуется резкий запах аммиака, у ученика слезятся глаза и начинается кашель. Это сигнал немедленно прекратить обычные занятия и оценить опасность.

2. Быстрый выход

Класс покидает помещение, дверь закрывают, чтобы уменьшить распространение газа. Двигаться нужно спокойно и без толкотни, не задерживаясь внутри.

3. Помощь после выхода


На свежем воздухе снимают загрязнённую одежду, промывают глаза водой и сообщают взрослым. Пострадавшего нельзя оставлять одного.

4. Вызов 112

Если симптомы усиливаются, вызывают 112 и называют адрес, предполагаемое вещество и число пострадавших. Быстрая реакция помогает избежать осложнений.

Как сообщать о происшествии в экстренные службы

Порядок короткого и точного сообщения по номеру 112



Краткая памятка по первой помощи при АХОВ

Памятка помогает быстро вспомнить главное: сначала безопасность, потом простые действия помощи и немедленное обращение за помощью взрослых и медиков.

Ключ к снижению вреда — не терять время и действовать по признакам. Простые шаги работают лучше всего в первые минуты после контакта.

Ситуация	Действие
Запах/облако	Уйти
Кашель/слезы	Сообщить 112
Кожа	Снять одежду
Глаза	Промывать 10–15 мин
Трудно дышать	Свежий воздух

Главный вывод: действовать быстро и безопасно

При отравлении АХОВ решают первые минуты: сначала защитить себя, затем вывести пострадавшего из зоны поражения, промой загрязнённые участки и сразу вызывай 112.