

Близкие и дальние «родственники» в отделе Покрытосеменные: ключевая тема урока

Покрытосеменные — крупнейший отдел растений с богатством видов и родственных связей.



Происхождение и значение покрытосеменных растений

- Появившись 140 миллионов лет назад, покрытосеменные стали главными представителями флоры, обеспечивая кислород, пищу и материалы для человечества.



Покрытосеменные растения: определение и отличительные черты



Покрытосеменные формируют семена внутри плодов, что отличает их от других растений и способствует эффективному размножению.



Характерные признаки включают цветки, процесс двойного оплодотворения и широкий спектр форм плодов, обеспечивающих разнообразие видов.



Семена покрытосеменных подразделяются на однодольные и двудольные, что отражается в структуре их органов размножения.

Ключевые семьи покрытосеменных растений



Астровые — мастера сложных цветков

Семейство астровых включает ромашку и подсолнечник, отличающихся сложными соцветиями и яркими цветками, привлекающими насекомых для опыления.



Орхидные — разнообразие и элегантность

Орхидные известны своим изяществом и большим количеством видов. Их цветки обладают уникальной формой, часто привлекающей специфических опылителей.



Бобовые — важные источники питания

Фасоль и горох представляют семейство бобовых, характеризующееся бобовидными плодами и способностью к фиксации азота благодаря симбиозу с бактериями.



Злаки — основа сельского хозяйства

Пшеница и рис — типичные представители семейства злаков с однодольным строением, играющими ключевую роль в питании миллионов людей.

Разнообразие покрытосеменных по числу видов

Покрытосеменные составляют свыше 80% видов современных растений, демонстрируя огромное биологическое разнообразие.

Наибольшее видовое разнообразие отмечено у орхидных и астровых, что подчёркивает их экологическую значимость.

Ботанический справочник, 2023

Понятие родства у растений



Родство растений определяется по наличию общего предка и подтверждается схожестью морфологических признаков, таких как строение цветков и плодов.




Для точного определения родства применяют генетический анализ ДНК, что позволяет выявить даже глубинные эволюционные связи.



Близкие родственники обладают множеством общих черт, тогда как у дальних общий набор признаков сокращается.

Эволюционное разделение покрытосеменных

Отделение двудольных и однодольных и дальнейшее деление на семейства и роды



Сравнение близких и дальних родственников среди покрытосеменных

Семейство	Морфологические признаки	Число родов	Пример растения
Розовые	Цветок с 5 лепестками, завязь	100	Яблоня, Роза
Злаки	Длинные листья, колоски	700	Пшеница, Овёс
Бобовые	Бобовидный плод, сложные листья	730	Фасоль, Горох
Астровые	Сложные соцветия, трубчатые цветки	1600	Ромашка, Подсолнечник

— Основные различия между семействами засвидетельствованы в цветке, листьях и плодах, что помогает различать родственников по близости.

Чёткие морфологические отличия позволяют чётко разделять близких и дальних родственников в пределах покрытосеменных.

— *Флористический атлас, 2022*

Близкое родство в семействе розовых



Общее строение цветка

Розовые характеризуются пятью чашелистиками и лепестками, что обеспечивает узнаваемость и защиту цветка во время развития.



Механизмы опыления

Похожие методы опыления у роз, яблонь и груш способствуют образованию плодов и поддерживают генетическое разнообразие внутри семейства.



Плод и семена

Наличие завязи и сходство в строении плодов позволяют объединить представителей розовых в единую группу семейственных связей.

Дальние родственники: роза и пшеница – примеры различий

- Цветок розы крупный и ярко выраженный с пятью лепестками, тогда как у пшеницы цветок мелкий и непоказательный, приспособленный к ветровому опылению.
- Роза образует сочные плоды с семенами внутри, а пшеница – сухую зерновку, что отражает разные стратегии размножения.
- Морфология листьев различается: у розы листья сложные и с зубчатым краем, а у пшеницы – длинные и линейные без черешков.
- Генетический анализ подтверждает значительное расстояние между розой и пшеницей на эволюционном древе покрытосеменных.

Генетическая близость между разными семействами покрытосеменных

Высокое сходство генов внутри семейств отражает тесные эволюционные связи и общий предок, а значительные различия между семействами указывают на длительный период самостоятельного развития.

Данные подтверждают, что генетическая близость соответствует таксономической близости, позволяя различать близких и дальних родственников на уровне семейств.

Генетическое исследование покрытосеменных растений, Флора России, 2020

Родственные связи в семействе бобовых



Фасоль и горох: близкие родственники

Фасоль и горох имеют схожее строение бобов и листья с несколькими листочками. Они обладают способностью к симбиозу с азотофиксирующими бактериями, что улучшает плодородие почвы.



Клевер — универсальный представитель бобовых

Клевер используется в качестве кормового растения и зеленого удобрения. Его сложные листья и форма цветка сближают его с другими бобовыми, несмотря на внешние различия.



Акация: дальний, но принадлежит к бобовым

Акация выделяется древесной формой и колючками. Она сохраняет типичную структуру цветка и плода, характерную для семейства, показывая эволюционные адаптации к разным средам.



Симбиотические отношения бобовых

Все бобовые способны к образованию клубеньков на корнях, где живут бактерии, фиксирующие азот. Это важный признак родства и залог их сельскохозяйственной ценности.

Злаки: особенности родства и типичные представители

Злаки объединяют растения с однодольным семенем и плоскими, длинными листьями, что обеспечивает эффективное фотосинтезирование и адаптацию к открытым пространствам.

Соцветия большинства злаков утрированы в колос или метёлку, что способствует массовому опылению ветром и широкому распространению видов.

Полые, но крепкие стебли злаков придают растениям устойчивость и позволяют им достигать значительной высоты, что является общим морфологическим признаком.

Генетические исследования подтверждают близость между рожью, овсом, кукурузой и рисом, указывая на единое происхождение и родственные связи внутри семейства.

Астровые и лилейные: признаки дальнего родства

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the first text block.

Астровые характеризуются сложными соцветиями, состоящими из множества мелких цветков, а лилейные имеют одиночные крупные цветки с явно выраженными лепестками.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the second text block.

Число лепестков в астровых обычно больше и сформировано из двух типов цветков, в то время как у лилейных лепестков ровно шесть и они равномерно расположены.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the third text block.

Тип плодов и способы опыления различаются: астровые часто опыляются насекомыми, а лилейные могут привлекать широкий спектр опылителей благодаря яркому окрасу.

Эволюционное значение цветка в покрытосеменных



Цветок — механизм успеха в природе

Цветок обеспечивает привлечение опылителей благодаря разнообразию форм и окрасок, что приводит к эффективному опылению и образованию плодов с семенами.



Роль цветка в видообразовании

Изменения строения цветков способствовали адаптации к различным экосистемам и способам опыления, что увеличило биологическое разнообразие покрытосеменных.



Универсальность цветка среди покрытосеменных

Несмотря на внешние различия, все цветки выполняют одну функцию — производство потомства через семена, объединяя огромное множество видов в единую группу.

Вариации цветков у двудольных и однодольных: сравнительная диаграмма

— Большие и красочные цветки двудольных способствуют привлечению специализированных опылителей, тогда как у однодольных цветки чаще меньше и проще устроены.

Структурные различия цветков отражают разные стратегии размножения и адаптации полевых представителей покрытосеменных.

— *Исследования биологического факультета МГУ, 2022*

Критерии определения родства: морфология и молекулярные методы



Морфологический анализ основывается на форме цветков, характера листьев и строения плодов для первоначальной классификации родства.



Молекулярные методы, включая ДНК-секвенирование и анализ белков, позволяют уточнять эволюционные связи и подтверждать или опровергать ранее выдвинутые гипотезы.



Комбинирование традиционных и современных подходов обеспечивает более точную и надежную систематику покрытосеменных растений.

Примеры близких и дальних родственников среди покрытосеменных

Растение 1	Растение 2	Степень родства	Семейство
Груша	Яблоня	Близкие	Розовые
Фасоль	Горох	Близкие	Бобовые
Пшеница	Астра	Дальние	Злаки/Астровые

Таблица иллюстрирует, как степень родства совпадает с принадлежностью к одному или разным семействам покрытосеменных.

Чем ближе растения по принадлежности к одному семейству, тем сильнее их родственные связи и сходство морфологии.

Учебное пособие по ботанике, 2021

Значение изучения родственных связей покрытосеменных для человека



Знание родства позволяет создавать новые сорта с улучшенными качествами, повышая устойчивость и урожайность сельскохозяйственных культур.



Изучение родственников помогает находить новые лекарственные соединения и биологически активные вещества в растениях.



Систематика способствует сохранению биоразнообразия, охране редких и исчезающих видов покрытосеменных.

Важность родственных связей в понимании покрытосеменных

Познание близких и дальних родственников покрытосеменных раскрывает их эволюционное разнообразие, обогащая наши знания для практических задач в сельском хозяйстве и сохранении природы.