



Обзор класса Брюхоногие моллюски: основные черты и значение

Брюхоногие — разнообразные моллюски, обитающие в воде и на суше.

Происхождение и эволюция брюхоногих моллюсков

- Брюхоногие появились более 500 млн лет назад в кембрийском периоде. Их эволюция сопровождалась изменениями в форму и функции раковины, что обеспечило приспособляемость к разным средам. Окаменелости отражают постепенное развитие и большой видовой набор современного класса.



Основные части тела брюхоногого



Голова и органы чувств

Голова моллюска оснащена щупальцами с органами восприятия и двумя глазами, помогающими ориентироваться в пространстве. Это позволяет эффективно находить пищу и избегать опасности.



Органы туловища

Туловище содержит внутренние органы, защищённые раковиной, и обеспечивает жизненно важные функции. Размещение органов связано с формой раковины.



Мускулистая нога

Нога — мощный мышечный орган, который служит для перемещения. Подошва выделяет слизь, уменьшая трение и облегчая движение по поверхностям.

Строение раковины и её функции

Раковина состоит из трёх слоёв: протеиново-хитинового, известкового и перламутрового, обеспечивая прочность и защиту.

Её основные функции — защищать моллюска от хищников, повреждений и предотвращать высыхание тела в неблагоприятных условиях.

У некоторых видов раковина уменьшена или отсутствует, что связано с особенностями их образа жизни и адаптациями.

Механизмы передвижения у брюхоногих



Волнообразное сокращение мышц ноги

Движение обеспечивается благодаря волнам сокращений мышц подошвы ноги, которые продвигают тело вперёд. При этом выделяется слизь, уменьшающая трение и предотвращающая повреждения.



Особые способности морских видов

Некоторые морские брюхоногие используют ногу для плавания или быстрого зарывания в песок, что помогает им скрываться от хищников и удерживаться на месте в приливных зонах.

Пищеварительная система брюхоногих

Пищеварительный тракт включает ротовое отверстие, глотку, пищевод, желудок и кишечник, завершаясь анусом.

Уникальный орган — рада, зубчатая терка, с помощью которой моллюск соскребает и измельчает пищу.

Основой питания являются растения, водоросли и бактерии; некоторые виды охотятся на мелких животных.

Процесс пищеварения эффективен, что способствует выживанию в различных экологических условиях.

Дыхательная и кровеносная системы

Морские брюхоногие дышат через жабры, адаптированные для извлечения кислорода из воды.

Наземные и пресноводные виды имеют лёгкие — специализированные полости для дыхания атмосферным воздухом.

Кровеносная система незамкнутая, сердце с одним желудочком и предсердием; кровь содержит голубой гемоцианин.

Нервная система и органы чувств

Нервная система построена из парных ганглиев, соединённых нервными стволами, обеспечивая координацию движений.

Глаза размещаются на щупальцах, обеспечивают базовую зрительную ориентацию.

Органы вкуса, обоняния и осязания развиты хорошо, помогая улиткам находить пищу и безопасные места.

Брюхоногие быстро реагируют на окружающие раздражители, что повышает шансы на выживание.

Особенности размножения и развития



Раздельнополые и гермафродитные виды

Среди брюхоногих есть и раздельнополые, и гермафродитные виды. Последние способны изменять роль партнёра при спаривании, что увеличивает шансы на успешное размножение.



Откладка яиц

Большинство моллюсков откладывают яйца в защищённые места, часто пряча их под листьями или на грунте, что минимизирует риск повреждения.



Развитие личинок

Некоторые виды развиваются напрямую, сразу после вылупления имеют вид миниатюрной взрослой особи, другие проходят стадию плавающих личинок — вельвигеров, адаптированных к водной среде.

Сравнение морских, пресноводных и наземных брюхоногих

Таблица демонстрирует отличия по среде обитания, типу дыхания и способу размножения, подчёркивая адаптивное разнообразие класса.

Разнообразие дыхательных и репродуктивных стратегий обеспечивает успешное освоение различных экосистем.

Среда обитания	Способ дыхания	Размножение
Морские	Жабры	Внешнее оплодотворение, свободноживущие личинки
Пресноводные	Лёгкие или жабры	Откладка яиц на растениях, прямое развитие
Наземные	Лёгкие	Откладка яиц в почву, прямое развитие

Морские брюхоногие моллюски: особенности и представители



Разнообразие литорин и мурексов

Литорины обитают на каменистых берегах и известны своей способностью жить в условиях приливов и отливов. Мурексы выделяются прочными раковинами с острыми шипами, которые помогают защититься от хищников.



Хищный рапан и его роль в экосистемах

Рапан — активный хищник, питающийся другими моллюсками. Благодаря своей пищевой активности он влияет на структуру морских сообществ и является ценной добычей в промысле.

Пресноводные брюхоногие: представители и значение

.....

Прудовики, катушки и физы широко распространены в пресноводных водоёмах с различной подвижностью воды и обеспечивают переработку органики в экосистемах.

.....

Эти моллюски служат пищей для рыб, птиц и амфибий, играя важную роль в пищевых цепях пресноводных биотопов.

.....

Некоторые виды способны впадать в анабиоз для выживания при пересыхании водоёмов, обеспечивая устойчивость популяций.

Наземные брюхоногие моллюски: среда обитания и адаптации

Наземные улитки и слизни заселяют влажные леса, сады и сельхозугодья, приспособлены к дыханию через лёгкие и выделяют слизь для предотвращения высыхания.

Эти моллюски проявляют активность преимущественно ночью или после дождя, а на зиму зарываются в почву, создавая защитные укрытия для перезимовки.



Виноградная улитка: строение и биология



Виноградная улитка — самая крупная наземная улитка России с раковиной до 5 см в диаметре. Она обитает на влажных лугах и питается молодыми зелёными растениями.

Живёт около 7 лет, зимой впадает в спячку, запечатывая вход в нору слизистой пробкой для защиты от холода и высыхания.

Взаимоотношения с окружающей средой

Брюхоногие улучшают структуру почвы и участвуют в разложении органических веществ, ускоряя круговорот питательных веществ.


Являются важным звеном пищевых цепей, служат кормом для множества животных – от рыб до насекомых.

Некоторые виды наносят ущерб сельскому хозяйству, повреждая посевы и культурные растения на ранних стадиях роста.

Разнообразие видов брюхоногих в разных средах

Морские брюхоногие занимают доминирующее положение в своем классе, обеспечивая высокую адаптивность к жизни в воде.

Данные говорят о широком ареале брюхоногих и их успешной адаптации к самым разнообразным средам обитания.



Биологические справочники, 2023

Экономическое значение для человека

Некоторые брюхоногие, например виноградная улитка и рапан, используются как деликатесы в кулинарии.


Ряд видов применяют в декоративном садоводстве и косметической промышленности благодаря выделяемой слизи.

Брюхоногие являются промежуточными хозяевами паразитов, таких как печёночный сосальщик, влияя на здоровье человека и животных.

Моллюски применяются для биоиндикации загрязнения окружающей среды и в экологическом мониторинге.

Жизненный цикл наземной улитки

Источник: изучение биологии наземных моллюсков



Интересные факты о брюхоногих моллюсках

Африканская ахатина может выживать в засушливых условиях, впадая в длительный анабиоз и восстанавливая активность при благоприятных условиях.

Тридакна — крупнейшая морская улитка, достигающая массы свыше 200 кг, и ярко окрашенные виды предупреждают хищников о своей токсичности.





Значимость брюхоногих моллюсков для природы и человека

Брюхоногие моллюски играют важную роль в экосистемах, поддерживая биологическое равновесие и влияя на экономику человека, поэтому их изучение остаётся актуальным и важным.