



Клеточное строение корня: основные темы и актуальность

Изучаем структуру корня и её влияние на рост и выживаемость растений.

Важность корня и клеточного строения

Корень фиксирует растение, всасывает воду и питательные вещества, обеспечивая жизнедеятельность. Клеточное строение корня определяет эффективность этих процессов и адаптацию к условиям среды.



Основные зоны и строение корня

Корневой чехлик — защита и обновление

Это покрывающий слой, защищающий зону деления от повреждений. Клетки чехлика быстро обновляются, обеспечивая постоянную защиту кончика корня.



Зона деления и роста — источник новых клеток

Расположена сразу за чехликом, здесь клетки активно делятся и растут, что определяет увеличение длины корня и формирование новых тканей.



Зона всасывания и проведения — питание растения

В этой области образуются корневые волоски для увеличения впитывающей поверхности и проводящие ткани для транспорта воды и веществ внутрь растения.



Корневой чехлик: функции и строение

1

Состоит из живых мелких клеток с тонкими стенками, которые защищают апикальную меристему от повреждений и высыхания.

2

Клетки чехлика постоянно обновляются, отмирая при изнашивании, что обеспечивает непрерывную защиту корневого кончика.

3

Чехлик покрывает самую концевую часть корня и помогает проникать корню в почву, снижая трение.

Зона деления: участок интенсивного роста

Находится прямо за корневым чехликом, состоит из мелких меристематических клеток с крупными ядрами.

Клетки активно делятся, создавая новые клетки, необходимые для формирования всех тканей корня.

Маленькие вакуоли и плотный цитоплазматический аппарат поддерживают быстрый клеточный делёж.

Темпы роста корня зависят от активности этих клеток, регулируя рост всей корневой системы.

5-10

**раз превышает
начальный размер, что
обеспечивает быстрый
рост корня.**

Клетки этой зоны удлинняются в 5–10 раз, их стенки истончаются, а вакуоли увеличиваются, увеличивая объем и длину корня.

Корневые волоски: роль в поглощении воды

Увеличение всасывающей поверхности

Корневые волоски вырастают до 1 мм, плотным слоем покрывая зону всасывания, что значительно расширяет контакт корня с почвой.

Активное поглощение воды и минералов

Эпидермиальные клетки волосков обладают тонкими стенками и обеспечивают эффективный обмен веществ между растением и почвой.



Зона проведения: транспорт веществ внутри корня

Содержит ксилему и флоэму — ткани, по которым вода, минеральные и органические вещества быстро перемещаются к другим частям растения.

Клетки этой зоны имеют утолщённые стенки для прочности и быстрого транспорта.

Благодаря дифференцировке здесь формируются специализированные структуры, обеспечивающие эффективное внутреннее движение веществ.

Меристема: источник новых клеток корня

Состоит из мелких клеток с крупными ядрами и плотной цитоплазмой, подготовленных к делению.

Обеспечивает непрерывный рост корня благодаря постоянному обновлению клеток.

Из клеток меристемы формируются все основные ткани корня, включая проводящие и запасающие.

Активность меристемы регулирует развитие корневой системы и адаптацию растения к среде.

Эпидерма: внешний слой защиты и всасывания

Строение эпидермы

Эпидерма состоит из одного слоя клеток без кутикулы, что облегчает поглощение воды и солей из почвы. Эти клетки плотно прилегают друг к другу, образуя защитный барьер.

Функция корневых волосков

Корневые волоски — специализированные клетки эпидермы, значительно увеличивающие площадь всасывания. Они прорастают в почву, обеспечивая активный обмен веществ с внешней средой.



Кора корня: особенности паренхимных тканей

Кора корня состоит из нескольких слоёв паренхимных клеток, в которых тонкие оболочки и крупные межклеточные пространства обеспечивают хранение и перемещение веществ.

Паренхимные клетки производят и откладывают крахмал и сахара, формируя энергетический запас, который растение использует в стрессовых условиях.

Функция коры включает транспорт воды и минеральных солей от эпидермы в центральный цилиндр, поддерживая питание и рост корня.

Основные типы клеток корня и их функции

Тип клетки	Главная функция	Особенности строения
Меристема	Интенсивное деление	Крупное ядро, мелкие вакуоли
Эпидерма	Поглощение воды, защита	Однорядные клетки, без кутикулы
Паренхима	Запас питательных веществ	Крупные межклетники, тонкие стенки
Проводящие клетки	Транспорт веществ	Утолщённые стенки, специализированные

Таблица отражает ключевые характеристики основных клеточных типов корня, показывая их функции и строение для обеспечения эффективной жизнедеятельности растения.

Разнообразие клеток обеспечивает комплексное выполнение функций, необходимых для роста и питания корня.

Эндодерма: специальный слой для фильтрации

Эндодерма представляет собой барьер между корой и центральным цилиндром, контролируя движение воды и растворённых веществ.

В её клетках присутствуют пояски Каспари — утолщённые участки клеточных стенок, препятствующие неконтролируемому прохождению веществ.

Эндодерма обеспечивает селективный транспорт, позволяя проникать только необходимым ионам и защищая внутренние ткани.

Эта структура важна для поддержания внутреннего гомеостаза, предотвращая накопление токсинов и избыточных солей.

Центральный цилиндр: проводящие и образовательные элементы

1

Центральный цилиндр включает ксилему — сосуды для восходящего транспорта воды и минеральных веществ.

2


Флоэма переносит питательные органические соединения, обеспечивая питание всех частей растения.

3

Перицикл формирует боковые корни и способствует утолщению корня, поддерживая его рост и адаптацию.

Этапы развития клеток корня

Последовательность преобразований клеток от меристемы до зрелого состояния.



Скорость роста корня по зонам



Максимальная скорость роста наблюдается в зоне растяжения, что связано с быстрым удлинением клеток.

Скорость роста изменяется по зонам, отражая разные процессы развития и специализации клеток.

Запас питательных веществ: вклад паренхимы и сердцевины

Паренхимные клетки коры и сердцевины накапливают крахмал и сахара, которые служат энергетическим ресурсом для растения при неблагоприятных условиях.

Инулиновые запасы обеспечивают дополнительный источник энергии, особенно важный в период покоя или стрессов.

Такие запасы стимулируют быстрый рост и развитие боковых корней при возобновлении активной фазы жизни растения.

Возрастные изменения клеточного строения корня

С возрастом происходит отмирание эпидермы, что снижает количество корневых волосков и уменьшает всасывающую поверхность.

На старых участках корня формируется пробка — феллема, предотвращающая излишнюю потерю воды и механическое повреждение.

Такие изменения ограничивают поглощение, но повышают защиту корня от внешних воздействий.

Возрастные трансформации влияют на корневую функцию, обеспечивая баланс между защитой и обменом веществ.

Адаптации строения клеток корня к среде обитания

Особенности клеток корней болотных растений

В корнях болотных растений развита аэренхима — ткани с большими межклеточными пространствами, которая облегчает движение кислорода и газов в условиях застоя воды.



Толстостенные клетки пустынных корней

У растений пустынь клетки корня имеют утолщённые стенки, что уменьшает испарение и улучшает удержание воды в условиях сильной засухи.



Плавучие клетки водных растений

Клетки корней водных растений отличаются крупным размером и низкой плотностью, что способствует плавучести и удерживанию растения на поверхности воды.



Значение клеточного строения корня для выживания растения

Клеточное строение корня обеспечивает жизненно важные функции — питание, транспорт, защиту и адаптацию, поддерживая здоровье и рост растения в различных условиях окружающей среды.