

Нуклеиновые кислоты и АТФ: основа наследственности и энергии клетки

ДНК, РНК и АТФ связывают наследственность, синтез белка и энергообмен клетки.

Почему ДНК, РНК и АТФ изучают вместе

Эти молекулы образуют единую систему: ДНК хранит информацию, РНК помогает её реализовать, а АТФ даёт энергию для клеточных процессов. Именно поэтому их рассматривают как взаимосвязанные основы жизни клетки.



Нуклеотид — мономер нуклеиновых кислот

Три составные части

Каждый нуклеотид включает азотистое основание, сахар-пентозу и остаток фосфорной кислоты. Именно такое строение позволяет нуклеотидам соединяться в длинные цепи и создавать молекулы нуклеиновых кислот.

Сахар в составе

В ДНК сахаром служит дезоксирибоза, а в РНК — рибоза. Различие в одном атоме кислорода влияет на свойства молекул: ДНК становится устойчивее, а РНК — более подвижной и разнообразной.

Азотистые основания

К пуринам относятся аденин и гуанин, к пиримидинам — цитозин, тимин и урацил. Набор оснований определяет, как именно будут соединяться нуклеотиды и какую информацию несёт молекула.

Фосфатный остаток

Фосфатная группа обеспечивает связь между нуклеотидами в цепи и придаёт молекулам отрицательный заряд. Благодаря этому нуклеиновые кислоты хорошо взаимодействуют с белками и другими клеточными структурами.

Информация в последовательности

Не отдельные нуклеотиды, а их порядок хранит генетическую информацию. Последовательность оснований задаёт структуру гена, а затем влияет на состав белка и проявление признака.

Сравнение ДНК и РНК

Основные различия между ДНК и РНК по строению, расположению и функции.

ДНК более стабильна и служит хранилищем наследственной информации, а РНК менее устойчива, но функционально разнообразна.

Признак	ДНК	РНК
Сахар	дезоксирибоза	рибоза
Основания	А, Т, Г, Ц	А, У, Г, Ц
Число цепей	две	одна

Строение двойной спирали ДНК

- **Две цепи**

Молекула ДНК состоит из двух антипараллельных цепей, закрученных в двойную спираль. Такое пространственное строение делает молекулу компактной и удобной для хранения наследственной информации.

- **Комплементарные пары**

Аденин соединяется только с тиминном, а гуанин — с цитозином. Именно принцип комплементарности обеспечивает точность копирования ДНК и стабильность её структуры в клетке.

- **Водородные связи**

Между парами оснований возникают водородные связи: две между А и Т и три между Г и Ц. Благодаря этому цепи удерживаются вместе, но при необходимости могут быть разъединены.


- **Сахарофосфатный остов**

Снаружи двойной спирали расположен сахарофосфатный остов, а внутри — пары оснований. Такое расположение защищает генетическую информацию и позволяет клеточным ферментам считывать её.



Как наследственная информация реализуется в клетке

Схема показывает путь от гена ДНК к синтезу белка и формированию признака.



Основные виды РНК и их функции



иРНК

Информационная РНК переносит сведения о последовательности аминокислот от ДНК к рибосоме. Она служит матрицей для сборки полипептидной цепи и определяет порядок соединения аминокислот.



тРНК

Транспортная РНК доставляет нужные аминокислоты к рибосоме. Её антикодон распознаёт кодон и обеспечивает включение именно той аминокислоты, которая соответствует данному участку иРНК.



рРНК

Рибосомная РНК входит в состав рибосом и обеспечивает их устойчивую структуру. Кроме того, она участвует в формировании пептидной связи, без которой синтез белка невозможен.



Регуляторные РНК

В клетках эукариот есть малые регуляторные РНК, которые влияют на активность отдельных генов. Они помогают тонко настраивать работу клетки и управлять количеством синтезируемых белков.




Единство в синтезе

Все виды РНК работают согласованно: одна несёт информацию, другая доставляет вещества, третья создаёт основу рибосомы. Благодаря этому клетка быстро и точно синтезирует нужные белки.

Правило Чаргаффа и соотношение азотистых оснований

Содержание оснований в ДНК может различаться у разных организмов, но внутри каждой молекулы сохраняется строгая парность.

Равенство $A = T$ и $G = C$ подтверждает комплементарность цепей и точную организацию двойной спирали.



Репликация ДНК перед делением клетки

Начало удвоения

Перед делением клетки ДНК должна быть скопирована полностью. Репликация начинается в особых участках молекулы, где ферменты получают доступ к цепям и подготавливают их к копированию.

Синтез и соединение

ДНК-полимераза достраивает новые нуклеотиды, а лигаза соединяет фрагменты цепи. Праймеры задают начало синтеза и помогают ферментам работать точно и последовательно.

Разъединение цепей

Хеликаза разрывает водородные связи между комплементарными основаниями и разделяет две цепи. На каждой из них затем строится новая, строго соответствующая исходной последовательности.

Результат процесса

Образуются две одинаковые молекулы ДНК, каждая из которых содержит одну старую и одну новую цепь. Такой полуконсервативный механизм обеспечивает наследственную преемственность.

Мутации: изменения в структуре ДНК

01

Виды мутаций

Мутации бывают генными, хромосомными и геномными. Они различаются масштабом изменения: от замены одного нуклеотида до перестройки больших участков хромосом или изменения числа хромосом.

03

Влияние на белок

Даже одна замена нуклеотида способна изменить кодон, затем аминокислоту в белке и его свойства. Иногда это не сказывается на организме, а иногда приводит к серьёзным нарушениям.

02

Причины возникновения

Изменения могут появляться спонтанно при копировании ДНК или под действием мутагенов. К ним относятся радиация, некоторые химические вещества и вирусы, нарушающие стабильность генетического материала.

04

Значение для организма

Последствия мутаций бывают нейтральными, вредными или полезными. Они лежат в основе наследственных заболеваний, но также создают наследственное разнообразие, необходимое для эволюции.



3

фосфатные группы образуют молекулу, из которой энергия высвобождается при их последовательном отщеплении.

АТФ быстро отдаёт энергию и так же быстро восстанавливается, поэтому служит кратким «энергетическим аккумулятором» клетки.

Учебный курс биологии; строение и функции АТФ

АТФ, АДФ и АМФ: сравнение молекул


Молекула	Фосфаты	Роль	Энергия
АТФ	3	Основной переносчик	Высокая
АДФ	2	Промежуточная форма	Средняя
АМФ	1	Наименее энергоёмкая	Низкая

Сравнение трёх форм адениловых нуклеотидов показывает, как меняется запас энергии при отщеплении фосфатных групп.

Чем меньше фосфатных групп, тем ниже энергетический потенциал; переходы между формами обратимы и поддерживают непрерывный обмен энергии.

Цикл синтеза и расходования АТФ


Схема отражает постоянное образование АТФ при клеточном дыхании и фотосинтезе, а также её расход в процессах жизнедеятельности.



Где клетка расходует АТФ

АТФ расходуется не в одном, а в большинстве ключевых процессов клетки: от переноса ионов до работы рибосом и сократительных белков.

Наибольшие затраты связаны с мембранным транспортом и механической работой, что подчёркивает универсальность АТФ как энергетического посредника.



Схематическое распределение по учебной биологии, без претензии на точную статистику

Почему энергия АТФ легко используется клеткой

Лёгкий гидролиз

Связи между фосфатными группами разрываются достаточно быстро, поэтому клетка получает энергию малыми порциями и без длительного ожидания.

Ферментативный контроль

Ферменты ускоряют перенос фосфатной группы и направляют реакцию в нужную сторону, делая энергетический обмен точным и управляемым.

Связь с работой клеток

Энергия АТФ сразу включается в синтез веществ, транспорт и движение, то есть используется именно там, где она требуется в данный момент.

Постоянное обновление


После расходования АТФ быстро восстанавливается из АДФ и фосфата, поэтому клетка не хранит большие запасы, а поддерживает непрерывный цикл.

Как изменения в ДНК отражаются на здоровье человека



Одна замена — другой белок

Если в ДНК меняется один нуклеотид, может измениться кодон, а затем и аминокислота в белке. Иногда это почти не заметно, но в других случаях белок теряет нормальную форму и функцию.




Когда сбой становится болезнью

Наследственные мутации могут нарушать работу клеток и приводить к тяжёлым заболеваниям, например серповидноклеточной анемии или муковисцидозу. На уровне белка это проявляется изменением свойств молекул и сбоем обмена веществ.

Уровни организации генетической информации

Переход от молекулы к признаку показывает, как небольшое изменение на одном уровне может сказаться на свойствах целого организма.

Чем выше уровень организации, тем сложнее упаковка и шире последствия изменений, поэтому даже одна мутация способна повлиять на фенотип.



Практическое значение изучения ДНК, РНК и АТФ



Генетическая диагностика

ПЦР и секвенирование позволяют выявлять мутации, подтверждать родство и диагностировать наследственные заболевания на ранних стадиях.



Анализ РНК

Изучение РНК помогает понять, какие гены активны в клетке, и обнаруживать некоторые вирусные инфекции по их генетическому материалу.



Современные вакцины

Технологии на основе иРНК показали, как знания о нуклеиновых кислотах могут быстро перейти из науки в медицину.



Энергетика клетки

Понимание роли АТФ объясняет, почему мышцы устают, как работает активный транспорт и зачем клетке постоянное обновление энергии.




Биотехнологии

Исследование ДНК и РНК лежит в основе генной инженерии, селекции и создания новых методов анализа в биологии и медицине.

От молекулы к признаку и энергии

Схема объединяет путь наследственной информации и путь обеспечения клетки энергией в одном клеточном механизме.



Жизнь клетки держится на двух молекулярных системах

ДНК и РНК несут и реализуют наследственную информацию, а АТФ обеспечивает её работу энергией. Вместе они образуют основу роста, деления, обмена веществ и наследования признаков.